

2: 19. — *Cyperus michelianus* subsp. *pygmaeus* (Rottb.) Aschers. et Graebn. 1904, Syn. Mitteleur. Fl. 2, 2: 273; Kük. 1936, in Engler, Pflanzenreich, 101: 311.

Описан из Индии.

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос. (Карталиния — оз. Куки), Триал.-Н. Карт. (Сомхетия); **ВЗ:** Н. Кур. (Карачала; Муганская степь близ с. Калагайны и в районе г. Сальяны); **Т** (Ленкоранский р-н: Марушли, устье Ленкорань-чая и с. Пришибинское; Астаринский р-н: пос. Машхат).

Указан для **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб. (Прилипо, 1952: 19, sub nom. *Dichostylis pygmaea*).

Юго-Вост. Европа (сев. Греция); Юго-Зап. (Турция, Ирак, Палестина; очень редок в Афганистане), Ср. (Туркменистан), Вост. (Китай), Юго-Вост., Южн. Азия; Сев., Центр. Африка; Австралия.

Приводимый вид вместе с *C. michelianus*, а также *C. hamulosus* Bieb. (= *Mariscus hamulosus* (Bieb.) S. S. Hooper) нередко выделяют в род *Dichostylis* P. Beauv. ex T. Lestib. Однако это родовое название незаконно, так как в его протолог в качестве синонима включено ранее обнародованное название *Echinolytrum* Desv. (см.: Егорова, 2002: 29). Пригодное название в ранге рода, которое можно было бы употребить вместо названия *Dichostylis*, отсутствует. В обнародовании нового родового названия нет необходимости, поскольку представляется правильной таксономическая позиция I. Kukkonen (1995), который выделил *C. michelianus* и *C. pygmaeus* в подрод *Micheliani* (C. V. Clarke) Kukkonen.

Растения *C. michelianus* и *C. pygmaeus* различаются главным образом по расположению кроющих чешуй в колосках, которое у первого — спиральное, у второго — двурядное. Иногда оба вида рассматриваются в качестве подвидов *C. michelianus* s. l. Ареалы *C. michelianus* и *C. pygmaeus* частично совпадают, но в основном второй вид распространен южнее первого. На Кавказе в некоторых пунктах (низовья Куры у г. Сальяны и в Ленкорани у пос. Марушли) встречаются оба вида, причем сборы их из названных мест имеют одинаковые этикетки. А. А. Гроссгеймом (1940: 6) распространение *C. pygmaeus* на Кавказе показано шире, чем здесь, так как за этот вид им была принята часть образцов *C. michelianus*.

Имеются данные, по всей вероятности ошибочные, о произрастании на Кавказе *Cyperus iria* L. Кавказ (без детализации) включен в ареал этого вида во «Flora Iranica» (Kukkonen, 1998: 109).

13. (80). *Juncellus* (Griseb.) C. V. Clarke (= *Acorellus* Palla)*

1. (443). **J. pannonicus** (Jacq.) C. V. Clarke, 1908, Kew Bull. Add. ser., 8: 3; Егор. 1976, Фл. Европ. части СССР, 2: 125; она же, 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 16; P. H. Davis, Kit Tan, 1985, Fl. Turk. 9: 42; Kukkonen, 1998, in Rech. f., Fl. Iran. 173: 133; Ханджян, 2001, Фл. Арм. 10: 419. — *Cyperus pannonicus* Jacq. 1778, Fl. Austr. 5, Arr.: 29, tab. 6. — *Acorellus pannonicus* (Jacq.) Palla, 1905, in Hallier u. Brand, Koch's Deutsch. Schweiz. Fl., 3 Aufl., 3: 2557; Шишк. 1935, Фл. СССР, 3: 10; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 7, карта 12.

Описан из Венгрии.

ЗП: Аз.-Куб. (зап.); **ВП:** В. Ставр. (Моздок), Тер.-Кум. (оз. Б. Киссык и Ачикулакский р-н), Тер.-Сулак.; **ВК:** В. Сулак. (Кази-Кумух, Чирюрт), Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Анапа); **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Поти); **ЮЗ:** Ерев., Севан.; **Т** (Ленкорань, п-ов Сара).

Указан для **ЗК:** Уруп.-Теб. (Танфильев, Кононов, 1987: 20).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. (юг) Европа; Средиз.; Сев. (юг Зап. Сибири), Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр. (зап.), Вост. Азия.

*Т. В. Егорова