

рия, Ливан, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Южн. Азия; Сев., Центр., Южн. Африка; Сев., Центр., Южн. Америка; ? Австралия.

Для Дагестана (ВК: В. Сулак.) вид впервые был приведен (Егорова, 2005) по недавно определенным сборам Н. Н. Цвелёва, С. К. Черепанова и др. (LE), сделанным в 1961 г.

15. (82). *Mariscus* Vahl*

1. (448). *M. congestus* (Vahl) C. B. Clarke, 1895, in T. Durand, Schinz, Consp. Fl. Afr. 5: 553; P. H. Davis, Oteng-Yeb. 1985, Fl. Turk. 9: 43; Егор. 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 18. — *Cyperus congestus* Vahl, 1805, Enum. Pl. 2: 358; Kük. 1936, in Engler, Pflanzenreich 101: 445. — *Mariscus cyri* Grossh. 1939, Изв. Азерб. фил. АН СССР, 5: 72; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 9; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 652; Прилипка, 1952, Фл. Азерб. 2: 24, табл. 3.

Описан из Южной Африки.

ВЗ: Н. Кур. (Карабахская степь в окр. с. Авад на правом берегу Куры); заносный.

Указан (без обозначения местонахождений) для Грузии (по сборам Hohenacker) и для р. Куры (по сборам Owerin) (Kükenthal, 1936: 445).

Южн., Юго-Вост. (Европейская Турция) Европа (заносный); Юго-Зап. Азия (сев.-зап. Турция, заносный); Южн. Африка; Австралия.

Образец из цитированного местонахождения (он собран Л. И. Прилипка 24 IX 1927 г.), являющийся типом *Mariscus cyri* Grossh., l. c., принадлежит, как было установлено ранее (Егорова, 1991: 18), распространенному в Южной Африке и Австралии *M. congestus*. На Кавказе этот вид заносный, так же, как и в других, указанных выше регионах Европы и Азии.

16. (83). *Kyllinga* Rottb.*

1. (449). *K. gracillima* Miq. 1866, Ann. Mus. Bot. Lugd.-Batav. 2: 142; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 9; Колак. 1986, Фл. Абх. 4: 148; Дмитриева, 1990, Определ. раст. Адж., изд. 2, 2: 175; Егор. 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 18. — *Cyperus brevifolius* (Rottb.) Hassk. var. *γ. gracillimus* (Miq.) Kük. 1936, in Engler, Pflanzenreich, 101: 603. — *Kyllinga brevifolia* Rottb. var. *leirolepis* (Franch. et Sav.) Nara, 1938, Journ. Jap. Bot. 14: 339. — *K. brevifolia* auct. non Rottb.: Шишк. 1935, Фл. СССР, 3: 25; Kukkonen, 1998, in Rech. f., Fl. Iran. 173: 152, p. p., quoad pl. sauc.

Описан из Японии.

ЗЗ: Абх. (старика Псоу в окр. пос. Леселидзе; устье р. Кодор; Очамчирский и Гальский р-ны), Инг.-Рион. (Мингрелия: район Зугдиди), Адж. (Чаква, Кобулет, Ачкау, Махинджаури, Батумский ботанический сад и др.). — Заносный, как сорный в посевах, на болотистых местах.

Вост. Азия (Центр., Вост. Китай, п-ов Корея, Япония), Сев. Америка (восток США, заносное).

По данным А. А. Колаковского (1986), вид обычен в приморской полосе Абхазии, особенно в Очамчирском и Гальском районах.

Близок к описанному из Индии *K. brevifolia* Rottb., образцы вида отличаются от представителей последнего главным образом гладкими по килу, а не шероховатыми кроющими чешуями. I. Kukkonen (1998) приводит *K. brevifolia* по единичным сборам для Афганистана и Пакистана.

2. (450). *K. nemoralis* (J. R. et G. Forst.) Dandy ex Hutch. 1936, in Hutch. et Dalziel, Fl. West Trop. Afr., [ed. 1], 2, 2: 487; Егор. 1991, Новости сист. высш. раст.

*Т. В. Егорова