

повторно описавшей его из Ленкорани, с побережья Каспийского моря (о. Сара, ныне полуостров) под названием *C. grossheimii* Pobed., l. c.

От растений близкого вида *C. mariscus*, представители *C. martii* отличаются широким, более или менее раскидистым, обычно сплошным (не прерывистым) общим соцветием с рыхлыми, сильно ветвистыми боковыми соцветиями до 20 см дл. с многими удлиненными веточками и колосками, собранными по 3–7 (10) в рыхловатые, очень многочисленные пучки (у растений *C. mariscus* общее соцветие узкое, прерывистое, с компактными, слабо ветвистыми боковыми соцветиями 6–10 (15) см дл. с немногими (1–3) удлиненными веточками и колосками, сгущенными по 5–20 (30) в плотные, относительно немногочисленные шаровидные пучки. Идентификация обоих видов возможна лишь при наличии у их образцов хорошо сформированных соцветий.

*C. martii* очень редок в Северо-Западном Закавказье, где, по данным А. С. Зернова (2000: 26), в настоящее время достоверно известен в Новороссийском р-не (см. выше). В Аджарии вид, возможно, исчез в связи с осушением болот (Дмитриева, 1990, 2: 179).

Следует отметить, что видовая самостоятельность *C. martii* не признана I. Kukkonen (1998, l. c.), который растения этого вида, встречающиеся на территории, охватываемой «Flora Iranica», относит к *C. mariscus* subsp. *mariscus*. В качестве других подвидов *C. mariscus* иногда рассматриваются *C. jamaicense* Granz (тропики Америки) и *C. procerum* S. T. Blake (Австралия).

## 19. (86). *Schoenus* L.\*

1. (455). **S. nigricans** L. 1753, Sp. Pl.: 43; Рожев. 1935, Фл. СССР, 3: 101; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 27, карта 34; Егор. 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 20; Kukkonen, 1998, in Rech. f., Fl. Iran. 173: 154; А. Зернов, 2000, Раст. Сев.-Зап. Закавказ.: 27; Ханджян, 2001, Фл. Арм. 10: 452.

Описан из Европы.

**ЦК:** В. Кум. (Пятигорск); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Анапа); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (окр. Туапсе: мыс Кадош; окр. Сочи: мыс Дагомыс), Абх.; **ЮЗ:** Ерев., Нах. (между г. Ордубадам и пос. Даста), Мегр.-Зан. (между г. Мегри и г. Ордубадам); **Т** (Ленкорань и п-ов Сара).

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (низовья Кубани); **ВП:** Тер.-Сулак. (низовья р. Терек) (Галушко, 1978: 121); **ВК:** В. Сулак. (Гуниб); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Карталиния: между сс. Мухрань и Ксанка) (Гроссгейм, 1940: 27, карта 34).

Атл., Сев. (южн.), Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. (зап. и южн.) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ливан, Кипр, Палестина, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Южн. (Гималаи) Азия; Сев., Южн. Африка; Сев. (юг США), Центр. (Мексика) Америка; Австралия.

Для **ЮЗ:** Мегр.-Зан. приведен по сборам А. А. Гроссгейма (LE!); возможно, указанное им местонахождение расположено на территории Нахичеванской АР.

## 20. (87). *Rhynchospora* Vahl\*

1. (456). **R. alba** (L.) Vahl, 1805, Enum. Pl. 2: 236; Рожев. 1935, Фл. СССР, 3: 103; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 28, карта 36; Kit Tan, Oteng-Yeb. 1985, in Davis, Fl. Turk. 9: 70; Дмитриева, 1990, Определ. раст. Адж., изд. 2, 2: 179; Егор. 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 20; Амирханов и др., 1996, Бот. журн. 81, 10: 116. — *Schoenus albus* L. 1753, Sp. Pl.: 44.

Описан из Европы.

**ЦК:** В. Тер. (Сев. Осетия, басс. р. Камбилеевки: Тарская котловина); **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Поти: оз. Палеостом; Цаленджиха), Адж. (район Батуми: Султановская дача, Смекаловка; Кобулет); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Юго-Осетия: с. Фаткуджин).

Указан для **ЦК:** В. Кум. (Железноводск) (Флеров, 1938: 82).

\*Т. В. Егорова