

Описан с Кавказа. Тур у s: «Грузия, Аджария, сев. макросклон Шавшетского хребта, окр. с. Гогадзееби, 1500 м н. у. м., эвтрофное болото, 10 VIII 1966, К. Р. Кимеридзе» (TGM!).

**ЗК:** Бело-Лаб. (Апшеронский р-н, окр. пос. Верхние Тубы — водораздельный хребет между реками Пшеха и Хахопсе); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (окр. г. Адлера — верховья р. Мзымты), Инг.-Рион. (между Диди-ве и Хобис-гави; истоки р. Лебарде), Адж. (сев. макросклон Шавшетского хребта — окр. с. Гогадзееби и Шуахевский р-н, р. Тбети).

Эндемик.

Очень близок североамериканскому виду *S. atrocinctus* Fern. *S. colchicus* габитуально сходен с *S. sylvaticus* L., от которого отличается отсутствием ползучих корневищ, черными основаниями кроющих листьев и гладкими околоцветными щетинками, которые при созревании плодов удлиняются и выступают из кроющих чешуй, придавая колоскам вид «шерстистых» (у *S. sylvaticus* основания кроющих листьев зеленые, околоцветные щетинки шероховатые, скрытые в пазухах кроющих чешуй).

2. (394). *S. sylvaticus* L. 1753, Sp. Pl.: 51; Рожев. 1935, Фл. СССР 3: 44, р. р.; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 14; Егор. 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 6; она же, 2004, цит. соч. 36: 73; Ханджян, 2001, Фл. Арм. 10: 440.

**ЗП:** З. Ставро. (Ставрополь); **ВП:** В. Ставро. (пос. Александровское); **ЗК; ЦК:** В. Кум. (Железноводск), Малк. (Балкария: Сукан, Чайнашки, Суук-ауз; Прохладненский р-н: ст. Солдатская; басс. р. Баксан: Черная Речка); **ВК:** Ассо-Арг. (Сунженский р-н: окр. с. Верхний Аргун; водораздел рек Фортанги и Осухи); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (верховья р. Мзымты; Красная Поляна, Аше и гора Аутль), Абх., Инг.-Рион. (горы Накерана), Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт. (Цалка), Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев. (Мисхана), Севан.

Указан для **СЗЗ** (Зернов, 2000: 27); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Маралик); **ЮЗ:** Дар. (Джермук), Занг. (отроги горы Арамазд) (Ханджян, 2001: 440).

Европа; Средиз.; Сев. (южн.), Юго-Зап. (сев.-вост. Турция), Ср. (Казахстан) и Центр. (Китай: Джунгария) Азия.

## 2. (69). *Eriophorum* L.\*

1. (395). *E. latifolium* Норре, 1800, Bot. Taschenb.: 108; Юз. 1935, Фл. СССР 3: 29, р. р., excl. pl. ex Sibir. et Or. Extr.; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 12; Ханджян, 2001, Фл. Арм. 10: 448.

Описан из Германии.

**ЗК:** Уруп-Тоб.; **ЦК:** В. Тер. (Байдара); **ЗЗ:** Инг.-Рион., Адж. (верх. р. Аджарисцкали и Аджаро-Шавшетский хр.); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Юго-Осетия: Эрмани и Эрцойская котловина), Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд. (район Гянджи — ущ. Кюрач-чай; горы Кяпаз и Керогли); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ахур.; **ЮЗ:** Дар. (Азизбеков и с. Куци — берег р. Арпачай).

Европа; Юго-Зап. Азия (сев.-вост. и центр. Турция).

2. (396). *E. angustifolium* Honck. 1782, Vollst. Syst. Verz. Gew. Teutschl. 1: 153. — *E. polystachion* L. 1753, Sp. Pl.: 52, nom. rejic. — *E. angustifolium* Roth, 1788, Tent. Fl. Germ. 1: 24; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 12. — *E. latifolium* auct. non Норре: Юз. 1935, Фл. СССР, 3: 29, р. р., quoad pl. ex Sibir. et Or. Extr.

\*М. С. Новосёлова

Описан из Германии(?).

**ЗК:** Бело-Лаб. (истоки р. Белой и Кавказский заповедник — хр. Дзюва), Уруп-Теб., В.-Куб.; **ЦК:** В. Кум. (Кисловодск), Малк.; **ЗЗ:** Абх. (верх. рек Секен и Уадхара).

Европа; Сев., Юго-Зап. (сев.-вост. Турция), Ср. (вост.), Центр. (зап.) и Вост. Азия; Южн. Африка (Трансвааль); Сев. Америка.

3. (397). **E. vaginatum** L. 1753, Sp. Pl.: 52; Юз. 1935, Фл. СССР, 3: 33; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 12; Ханджян, 2001, Фл. Арм. 10: 448.

Описан из Европы.

**ЗК:** Бело-Лаб. (южн.), Уруп-Теб. (южн.), В. Куб.; **ЦК:** Малк. (перевал из Безенги в В. Балкарию), В. Тер. (Дигория: Таторс); **ВК:** В. Сулак. (район Гуниба — подножье горы Шумхух-шеер у с. Кахи), Ман.-Самур. (басс. р. Самур), Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Бакуриани — Сакочавское оз.), Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агринч. (Грузия, Лагодехский р-н — верховья р. Анчал-ор и оз. Хала-гель), Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Занг. (Кафанский р-н — горы Капутджух и Саридара), Мегр.-Зан. (Армения, с. Личк).

Указан для **ВК:** Ассо-Арг. (Очаури, 1981: 96); **ЮЗ:** Ерев. (Памбакский хр.), Севан. (оз. Гили) (Ханджян, 2001: 448).

Европа; Сев., Юго-Зап. (сев.-вост. Турция), Вост. Азия; Сев. Америка.

### 3. (70). *Trichophorum* Pers.\*

1. (398). **T. pumilum** (Vahl) Schinz et Thell. 1921, Vierteljahr. Naturf. Ges. Zürich 66: 265; Рожев. 1935, Фл. СССР 3: 28; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 13, карта 44; Kukkonen, 1998, in Rech. f., Fl. Iran. 173: 50; Новосёлова, 2003, Новости сист. высш. раст. 35: 47. — *Scirpus pumilus* Vahl, 1805, Enum. Pl. 2: 243. — *Baeothryon pumilum* (Vahl) Á. et D. Löve, 1965, Univ. Colorado Stud., ser. Biol., 17: 14; Егор. 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 9. — *Eriophorella pumila* (Vahl) Kit Tan, 1985, in Davis, Fl. Turk. 9: 68. — *Kreczetoviczia pumila* (Vahl) Tzvel. 1999, Бот. журн. 84, 7: 112.

Описан из Швейцарии.

**ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Юго-Осетия: Эрманское ущелье и с. Эдиси).

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб. (Танфильев, Кононов, 1987: 21; Галушко, 1978: 116); **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 21), Малк. (верховья рек Кич-Малки и Малки (Гроссгейм, 1940: 13, карта 443; Галушко, 1978: 116, без указания пунктов), В. Тер. (Сев. Осетия, басс. р. Ардон: левобережье р. Мамисондон; Грузия, Хеви) (Амирханов и др., 1996: 116; Сахокия, Хуцишвили, 1975: 16).

Сев., Центр. и Вост. (восток России) Европа; Сев. (юг Зап. и Вост. Сибири), Юго-Зап. (южн. Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр., Вост. и Южн. (Гималаи) Азия; Сев. Америка.

*T. pumilum* — вид, очень редкий на Кавказе, так же как и в других частях своего ареала. В Гербарии ЛЕ к этому виду были ошибочно отнесены многие кавказские образцы габитуально сходного с ним *Eleocharis quinqueflora* (F. X. Hartm.) O. Schwarz, что нашло отражение и в литературе. Так, на основании неправильных определений два из этих образцов были приведены А. М. Амирхановым с соавт. (Амирханов и др., 1996: 116) как *Baeothryon pumilum* (= *Trichophorum pumilum*): Приэльбрусье, «верховья р. Кич-Малки, Бермамыт, 18 VIII 1939, Р. Еленевский»; Южная Осетия, «р. Средняя Эрмани, 20 VIII 1937, Е. Шмидт». Я не видела образца *T. pumilum*, обнаруженного названными авторами (Амирханов и др., 1996: 116) в Северной Осетии, хотя в их работе отмечено, что он передан в Гербарий ЛЕ. Мне также не известен процитированный ими под

\*Т. В. Егорова