

Описан из Германии(?).

ЗК: Бело-Лаб. (истоки р. Белой и Кавказский заповедник — хр. Дзюва), Уруп-Теб., В.-Куб.; **ЦК:** В. Кум. (Кисловодск), Малк.; **ЗЗ:** Абх. (верх. рек Секен и Уадхара).

Европа; Сев., Юго-Зап. (сев.-вост. Турция), Ср. (вост.), Центр. (зап.) и Вост. Азия; Южн. Африка (Трансвааль); Сев. Америка.

3. (397). **E. vaginatum** L. 1753, Sp. Pl.: 52; Юз. 1935, Фл. СССР, 3: 33; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 12; Ханджян, 2001, Фл. Арм. 10: 448.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб. (южн.), Уруп-Теб. (южн.), В. Куб.; **ЦК:** Малк. (перевал из Безенги в В. Балкарию), В. Тер. (Дигория: Таторс); **ВК:** В. Сулак. (район Гуниба — подножье горы Шумхух-шеер у с. Кахи), Ман.-Самур. (басс. р. Самур), Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Бакуриани — Сакочавское оз.), Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агринч. (Грузия, Лагодехский р-н — верховья р. Анчал-ор и оз. Хала-гель), Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Занг. (Кафанский р-н — горы Капутджух и Саридара), Мегр.-Зан. (Армения, с. Личк).

Указан для **ВК:** Ассо-Арг. (Очаури, 1981: 96); **ЮЗ:** Ерев. (Памбакский хр.), Севан. (оз. Гили) (Ханджян, 2001: 448).

Европа; Сев., Юго-Зап. (сев.-вост. Турция), Вост. Азия; Сев. Америка.

3. (70). *Trichophorum* Pers.*

1. (398). **T. pumilum** (Vahl) Schinz et Thell. 1921, Vierteljahr. Naturf. Ges. Zürich 66: 265; Рожев. 1935, Фл. СССР 3: 28; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 13, карта 44; Kukkonen, 1998, in Rech. f., Fl. Iran. 173: 50; Новосёлова, 2003, Новости сист. высш. раст. 35: 47. — *Scirpus pumilus* Vahl, 1805, Enum. Pl. 2: 243. — *Baeothryon pumilum* (Vahl) Á. et D. Löve, 1965, Univ. Colorado Stud., ser. Biol., 17: 14; Егор. 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 9. — *Eriophorella pumila* (Vahl) Kit Tan, 1985, in Davis, Fl. Turk. 9: 68. — *Kreczetoviczia pumila* (Vahl) Tzvel. 1999, Бот. журн. 84, 7: 112.

Описан из Швейцарии.

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос. (Юго-Осетия: Эрманское ущелье и с. Эдиси).

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб. (Танфильев, Кононов, 1987: 21; Галушко, 1978: 116); **ЦК:** В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 21), Малк. (верховья рек Кич-Малки и Малки (Гроссгейм, 1940: 13, карта 443; Галушко, 1978: 116, без указания пунктов), В. Тер. (Сев. Осетия, басс. р. Ардон: левобережье р. Мамисондон; Грузия, Хеви) (Амирханов и др., 1996: 116; Сахокия, Хуцишвили, 1975: 16).

Сев., Центр. и Вост. (восток России) Европа; Сев. (юг Зап. и Вост. Сибири), Юго-Зап. (южн. Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр., Вост. и Южн. (Гималаи) Азия; Сев. Америка.

T. pumilum — вид, очень редкий на Кавказе, так же как и в других частях своего ареала. В Гербарии ЛЕ к этому виду были ошибочно отнесены многие кавказские образцы габитуально сходного с ним *Eleocharis quinqueflora* (F. X. Hartm.) O. Schwarz, что нашло отражение и в литературе. Так, на основании неправильных определений два из этих образцов были приведены А. М. Амирхановым с соавт. (Амирханов и др., 1996: 116) как *Baeothryon pumilum* (= *Trichophorum pumilum*): Приэльбрусье, «верховья р. Кич-Малки, Бермамыт, 18 VIII 1939, Р. Еленевский»; Южная Осетия, «р. Средняя Эрмани, 20 VIII 1937, Е. Шмидт». Я не видела образца *T. pumilum*, обнаруженного названными авторами (Амирханов и др., 1996: 116) в Северной Осетии, хотя в их работе отмечено, что он передан в Гербарий ЛЕ. Мне также не известен процитированный ими под

*Т. В. Егорова

названием *B. pumilum* экземпляр из Дагестана («Дагестан, с. Кули, 6 VIII 1940, Р. Еленевский» — ? LE). Приведенные выше литературные указания о местонахождениях *T. pumilum* на Кавказе требуют проверки; возможно, часть из них относится к *E. quinqueflora*.

I. Kukkonen (1998, l. c.) приводит *T. pumilum* для Талыша, ссылаясь на карту № 16 в работе А. А. Гроссгейма «Флора Кавказа» (1940, изд. 2, 2). Однако на этой карте показано распространение *Schoenoplectus setaceus* (= *Isolepis setacea*) и *S. supinus*. Изображение ареала *T. pumilum* на Кавказе дано на карте № 44, но на ней (как и в тексте) Талыш не обозначен.

4. (71). *Bolboschoenus* (Aschers.) Palla*

Sect. 1. *Browningia* Tatanov

Subsect. 1. *Glauci* Tatanov

1. (399). *B. glaucus* (Lam.) S. G. Sm., 1995, Novon, 5: 101; Kukkonen, 1998, in Rech. f., Fl. Iran. 173: 21; Егор. и Татанов, 2002, Новости сист. высш. раст. 34: 39; Татанов, 2004, Новости сист. высш. раст. 36: 87. — *Scirpus glaucus* Lam. 1791, Tabl. Encycl. Méth. Bot. 1: 142. — *S. macrostachys* Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Bot. Berol. 1: 78 («*macarostachys*»), nom. illeg., non *S. macrostachyus* Lam. 1791, nom. illeg. superfl. — *S. maritimus* l. γ . *macrostachys* (Willd.) Vis. 1842, Fl. Dalm. 1: 109, nom. illeg. — *S. maritimus* var. *macrostachys* Meinsh. 1901, Тр. Петерб. бот. сада 18, 3: 251 («*macrostachya*). — *Bolboschoenus macrostachys* (Willd.) Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1: 145, comb. illeg.; Гроссг. 1940, цит. соч., изд. 2, 2: 18; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 654; Исаев, 1953, Фл. Азерб. 2: 37. — *B. maritimus* (L.) Palla var. *macrostachys* (Willd.) Egor. 1976, Фл. Европ. части СССР 2: 94, р. р., comb. illeg.; Егор. 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 8. — *B. maritimus* subsp. *macrostachys* (Willd.) Soják, 1983, Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. Přír. 153: 19, comb. illeg. — *B. maritimus* var. *cymosus* (Reichenb.) Kit Tan et Oteng-Yeb. 1985, in Davis, Fl. Turk. 9: 64, quoad pl., р. min. р. — *B. maritimus* var. *maritimus*: Kit Tan, 1985, in Davis, Fl. Turk. 9: 63, р. р.; Егор. 1991, цит. соч.: 8, р. р. — *B. maritimus* auct. non (L.) Palla: Рожев. 1935, Фл. СССР 3: 56, р. р.; Гроссг. 1940, цит. соч.: 18, р. р.; он же, 1949, цит. соч.: 654, р. р.; В. Креч. 1941, Фл. Груз. 2: 352, р. р.; Исаев, 1953, цит. соч.: 352, р. р.; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 119, р. р.; Kukkonen, 1998, l. c.: 18, р. р.; Ханджян, 2001, Фл. Арм. 10: 443, р. р. et auct. mult. fl. sauc.

Описан из Западной Африки.

ЗП: Аз.-Куб. (зап.), З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр. (юг: по р. Куме), Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл. (устье р. Псоу), Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.; **Т.**

Атл. (юг), Центр. (юг), Южн., Юго-Вост. и Вост. (юг России и Украины) Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр. (зап. и южн. Монголия; Китай: Джунгария) и Южн. Азия; Сев. Америка (США, заносный); Сев., Центр. и Южн. Африка.

Данный вид для флоры Кавказа был впервые приведен Т. В. Егоровой и мной (Егорова, Татанов, 2002). До этого растения *B. glaucus* относились авторами обработок рода *Bolboschoenus* во «Флорах» и «Определителях» по территории Кавказа к произрастающему в этом регионе виду — *B. maritimus*, а иногда к нему и к *B. macrostachys* (Willd.) Grossh. (Гроссгейм, 1928, 1940, 1949; Исаев, 1953), либо к *B. maritimus* (L.) Palla var. *maritimus* и var. *macrostachys* (Willd.) Egor. (Егорова, 1991; Ханджян, 2001). Комментарии, касающиеся базинима названий *B. macrostachys* и

*И. В. Татанов (Татанов, 2004б, 2006)