

Атл., Сев. (южн.), Центр., Южн., Юго-Вост. и Вост. (запад Белоруссии — заносный, юг Украины) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ливан, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр., Вост. и Южн. (Гималаи) Азия; Сев., Центр. и Южн. Африка; Сев. Америка (запад США, заносный), Австралия (заносный в Тасмании).

8. (75). *Blysmus* Panz. ex Schult.*

1. (415). *B. compressus* (L.) Panz. ex Link, 1827, Hort. Berol. 1: 278; Рожев. 1935, Фл. СССР 3: 58; Гроссг. 1940, Фл. Кавк., изд. 2, 2: 19, карта 26; Егор. 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 9; Kukkonen, 1998, in Rech. f., Fl. Iran. 173: 43, p. p., quoad subsp. *compressus*; Ханджян, 2001, Фл. Арм. 10: 449. — *Schoenus compressus* L. 1753, Sp. Pl.: 43.

Описан из Англии, Швейцарии и Италии.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тоб., В. Куб. (истоки р. Битюк-тюбе и окр. с. Хурзук); **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан. (Армения).

Указан для **ЗЗ:** Адж. (Зекарский перевал); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Гроссгейм, 1940: 19, карта 26); **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Караб. (Гроссгейм, 1940: 19, карта 26; Прилипко, 1952: 38), Мург.-Муровд. (Армения: между Туманяном и Лорутом) (Ханджян, 2001: 449); **ЮЗ:** Ю. Караб. (Прилипко, 1952: 38); **Т** (Тальшские горы) (Гроссгейм, цит. соч.: 19, карта 26; Прилипко, 1952: 38).

Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран, Афганистан), Ср., Центр. (зап.) Азия; Сев. Африка

I. Kukkonen (1998, l. c.) разделяет *B. compressus* на 2 подвида, преимущественно европейский — subsp. *compressus*, и азиатский — subsp. *brevifolius* (Decne.) Kukkonen, 1995 (= *Scirpus brevifolius* Decne. 1844; = *Blysmus sinocompressus* Ts. Tang et F. T. Wang, 1961). Оба подвида он приводит для территории, охватываемой «Flora Iranica», причем последний подвид — для ее восточных регионов (вост. и сев.-вост. Афганистан; Пакистан), а также для некоторых районов Ср., Центр. и Южн. Азии, Монголии, юга Центр. Сибири и Китая. Упомянутые подвиды рассматриваются нами в качестве самостоятельных видов.

9. (76). *Eleocharis* R. Br.*

Во «Флоре СССР» (Цинзерлинг, 1935) и ряде региональных флористических сводок, в том числе и по флоре Кавказа, первоначальное написание родового названия — *Eleocharis* R. Br. 1810 — изменено на *Heleocharis* R. Br. 1810, corr. Lestib. (1819, Essai Fam. Сурег.: 41). Последнее название было предложено к консервации в 1950 г., однако предложение об его консервации не было принято (подробнее см.: Егорова, 2001: 58). Поэтому род следует называть *Eleocharis*. В настоящей обработке во всех номенклатурных абзацах написание *Heleocharis* заменено на *Eleocharis*.

Subgen. 1. *Zinserlingia* Egor.

1. (416). *E. quinqueflora* (Hartm.) O. Schwarz, 1949, Mitt. Thüring. Bot. Ges. 1, 1: 89; Егор. 1981, Новости сист. высш. раст. 18: 102, рис. 1, 7; она же, 1991, цит. соч. 28: 9; она же, 2001, цит. соч. 33: 63; Kukkonen, 1998, in Rech. f., Fl. Iran. 173: 66; Ханджян, 2001, Фл. Арм. 10: 429. — *Scirpus quinqueflorus* Hartm. 1767, Prim. Lin. Inst. Bot.: 85. — *S. pauciflorus* Lightf. 1777, Fl. Scot. 2: 1078. — *Eleocharis pauciflora* (Lightf.)

*Т. В. Егорова