

Описан из Испании.

ЦЗ; ВЗ: Ширв., Н. Кур.; ЮЗ: Ерев., Нах., Ю. Караб.

Южн. Европа; Юго-Зап., Ср. (Туркмения), Южн. Азия; Сев. Африка.

2. (1090). *S. arabicus* Nees, 1841, Fl. Afr. Austr.: 422. — *S. barbatus* subsp. *arabicus* (Nees) Maire et Weiller, 1939, Bul. Hist. Nat. Afr. Nord, 30: 310.

Описан из Аравии: «In valle Hammæ Arabiae petraeae».

ВЗ: Ширв., Н. Кур.; ЮЗ: Ерев., Нах., Мерг.-Зан.

Южн., Вост. Европа; Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев., Южн. Африка.

### 105. (196). *Phragmites* Adans.

1. (1091). *P. australis* (Cav.) Trin. ex Steud. 1841, Nomencl. Bot., ed. 2, 2: 324. — *Arundo australis* Cav. 1799, Ann. Sci. Nat. (Paris) 1: 100. — *A. phragmites* L. 1753, Sp. Pl.: 81. — *Phragmites communis* Trin. 1820, Fund. Agrost.: 134. — *P. humilis* De Not. 1846, Cat. Hort. Genuen.: 27.

Описан из Австралии.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Европа; Азия; Сев. Африка; Сев. Америка; Австралия.

На солончаках встречается разновидность — var. *humilis* (De Not.) Tzvel. (1976, Злаки СССР: 607) — экземпляры с узкими, часто вдоль свернутыми листьями.

2. (1092). *P. altissimus* (Benth.) Nabile, 1869, Rech. Fl. Corse, 2: 39. — *Arundo altissima* Benth. 1826, Cat. Pl. Pyren.: 62. — *A. isiacæ* Delile, 1813, Descr. Egypte Hist. Nat. 2: 52, nom. illeg. — *Phragmites isiacus* (Delile) Kunth, 1829, Revis. Gram.: 80; Лавр. и Ком. 1934, Фл. СССР, 2: 305. — *P. australis* subsp. *altissimus* (Benth.) Clayt. 1968, Taxon, 17: 169.

Описан из Испании.

ЗП: Аз.-Куб.; ВП: Тер.-Сулак.; ВЗ: Н. Кур.; ЮЗ: Ерев., Севан., Нах., Занг., Мерг.-Зан., Ю. Караб.

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка.

### 106. (197). *Arundo* L.

1. (1093). *A. donax* L. 1753, Sp. Pl.: 81.

Описан из Южной Европы.

ЗЗ; ВЗ: Иорск.-Шек., Н. Кур.; Т.

Южн. Европа; Юго-Зап., Ср., Вост., Южн. Азия; Сев. Африка.

### 107. (198). *Cortaderia* Stapf

1. (1094). *C. selloana* (Schult. et Schult. f.) Aschers. et Graebn. 1900, Syn. Mitteleur. Fl. 2, 1: 325. — *Arundo selloana* Schult. et Schult. f. 1827, Add. ad Mant. 3: 605. — *A. dioica* Spreng. 1825, Syst. Veget. 1: 361, non Lour. 1793. — *Gynerium argenteum* Nees, 1829, Agrost. Bras.: 462. — *Cortaderia argentea* (Nees) Stapf, 1897, Gard. Chron., ser. 3, 22: 396. — *C. dioica* (Spreng.) Speg. 1902, Ann. Mus. Nac. Buenos-Ayres, 7: 194.

Описан из Уругвая.

СЗЗ; ЗЗ; ВЗ: Ширв.; Т (в культуре, в ЗЗ дичает).

Южн. Америка.