

Описан из Армении. Lectotypus (Цвелев, 1976: 152): «Armenia, apud Aschtarak et ultra Araxen fluv. apud Amarath, 1838, № 636, С. Koch» (LE! cum isoelectotypi).

ВП: Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур. (близ побережья); **ЦЗ:** Триал.-Н.Карт; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ;** Т.

Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Африка.

Sect. 2. *Micropyron* Nevski

5. (630). **E. triticeum** (Gaertn.) Nevski, 1933, Тр. Бот. ин-та АН СССР, сер. 1, 1: 18, in obs. — *Agropyron triticeum* Gaertn. 1770, Novi Comment. Acad. Sci. Petropol. 14, 1: 540. — *Secale prostratum* Pall. 1771, Reise, 1: 168, 485. — *Agropyron prostratum* (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 146.

Описан из бассейна р. Урал.

ЗП; **ВП;** **ЦК;** **ВК;** **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ;** Т.

Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.

10. (101). *Heteranthelium* Hochst.

1. (631). **H. piliferum** (Banks et Soland.) Hochst. 1843, in Kotschy, Pl. Aleppo: 130. — *Elymus pilifer* Banks et Soland. 1794, in Russell, Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 244.

Описан из Сирии (окр. Халеба). Турus: «Aleppo, Russell» (ВМ).

ЮЗ.

Юго-Зап., Ср., Южн. (Гималаи) Азия.

11. (102). *Amblyopyrum* (Jaub. et Spach) Eig

1. (632). **A. muticum** (Boiss.) Eig, 1929, Agr. Rec. (Tel-Aviv), 2: 200. — *Aegilops mutica* Boiss. 1844, Diagn. Pl. Or. Nov. 1, 5: 73. — *A. loliacea* Jaub. et Spach, 1851, Ill. Pl. Or. 4: 23, tab. 317.

Описан из Турции. Турus: «In Cappadocia ad Euphratem, Aucher 2977» (G).

ЗЗ: Адж. (долина Чороха); **ЮЗ:** Ерев.

Юго-Зап. Азия (Турция).

В Армении, как и в Турции, встречаются две разновидности этого вида: var. *muticum* — с волосистыми колосками и var. *loliaceum* (Jaub. et Spach) Eig — с голыми колосками.

12. (103). *Aegilops* L.

Subgen. 1. *Sitopsis* Jaub. et Spach

1. (633). **A. speltoides** Tausch, 1837, Flora (Regensb.) 22: 108; Мусаев, 1991, Злаки Азерб.: 51. — *A. aucheri* Boiss. 1844, Diagn. Pl. Or. Nov., ser. 1, 5: 74; Мусаев, 1991, Злаки Азерб.: 51. — *Triticum speltoides* (Tausch) Gren. ex K. Richt. 1890, Pl. Europ. 1: 129. — *Sitopsis speltoides* (Tausch) Á. Löve, 1984, Feddes Repert. 95, 7–8: 491.

Описан по культивируемым образцам неизвестного происхождения.

ВЗ: Ширв. (Апшеронский п-ов).

Юго-Вост. Европа (европейская Турция); Юго-Зап. Азия.