

1а. **A. littoralis** (Gouan) Parl. subsp. **littoralis**.

ЗП; ВП; ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.

Указан для **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Зернов, 2002: 55).

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия.

1б. **A. littoralis** (Gouan) Parl. subsp. **pungens** (Bieb.) Tzvel. 1971, Новости сист. высш. раст. 8: 73. — *Poa pungens* Bieb. 1800, Besch. Land. zwisch. Fluss. Terek u. Kur: 130. — *Aeluropus pungens* (Bieb.) C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 408.

Описан из Восточного Закавказья (долина Куры между Шемахой и Сальянами).
Турус: «*Poa pungens*, Casp.» (LE!).

ВП; ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ; ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах., Ю. Караб.

Вост. Европа (юго-вост.); Сев., Ср., Центр. Азия.

2. (1101). **A. repens** (Desf.) Parl. 1848, Fl. Ital. 1: 462. — *Dactylis repens* Desf. 1798, Fl. Atl. 1: 79. — *Aeluropus villosus* Trin. ex C. A. Mey. 1831, Verzeichn. Pfl. Cauc.: 18. — *A. lagopoides* subsp. *repens* (Desf.) Tzvel. 1967, Список раст. Герб. фл. СССР, 17: 46.

Описан из Северной Африки.

ВЗ: Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.; **Т:**

Юго-Зап., Ср., Южн. Азия; Сев. Африка.

111. (202). **Enneapogon** Desv. ex Beauv.

1. (1102). **E. persicus** Boiss. 1844, Diagn. Pl. Or. ser. 1, 5: 71. Цвел. 1976, Злаки СССР: 623. — *Pappophorum persicum* (Boiss.) Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 120.

Описан из Ирана. Турус: «*Persia austr.*, № 5430, leg. Aucher» (G).

ЮЗ: Мегр.-Зан.

Южн. (Испания) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

112. (203). **Cleistogenes** Keng

1. (1103). **C. serotina** (L.) Keng, 1934, Sinensia, 5: 149. — *Festuca serotina* L. 1759, Syst. Nat., ed. 10, 2: 876. — *Diplachne serotina* (L.) Link, 1827, Hort. Berol. 1: 155.

Описан из Италии.

ЗК: Адаг.-Пишиш., Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т:**

Центр. (юго-вост.), Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

2. (1104). **C. bulgarica** (Bornm.) Keng, 1934, Sinensia, 5: 149. — *Diplachne serotina* subsp. *bulgarica* Bornm. 1888, Bot. Centralbl. 36: 156. — *D. bulgarica* (Bornm.) Bornm. 1890, Bot. Centralbl. 37: 4; Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 310, 751. — *Cleistogenes maotica* Klok. et Zoz, 1940, Фл. УРСР, 2: 200.

Описан из Болгарии.

ЗП; ВП; ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тоб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Караб.

Центр. (юго-вост.), Юго-Вост. (Балканский п-ов), Вост. Европа.

3. (1105). *C. squarrosa* (Trin.) Keng, 1934, Sinensia, 5: 156. — *Molinia squarrosa* Trin. 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 105. — *Diplachne squarrosa* (Trin.) Maxim. 1879, Bull. Soc. Nat. Moscou, 54, 1: 71, in adnot.

Описан из Средней Азии. Lectotypus (Tzvelev, 1976: 629): «In deserto Kirghisi occidentali, С. А. Meyer» (LE).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.

Вост. (юг) Европа; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия.

113. (204). *Boriskellera* Terechov

1. (1106). *B. arundinacea* (L.) Terechov, 1938, Delect. Sem. Hort. Bot. Kujbyshev: 13; Цвелев, 1993, Бот. журн. 78, 10: 94. — *Aira arundinacea* L. 1753, Sp. Pl.: 64. — *Eragrostis collina* Trin. 1830, Mém. Acad. Sci. Pétersb., ser. 6, 1: 413. — *Poa tatarica* Fisch. ex Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 382. — *Eragrostis arundinacea* (L.) Roshev. 1934, Фл. СССР, 2: 319, non Jedwabn. 1924. — *E. tatarica* (Fisch. ex Griseb.) Nevski, 1937, Тр. Бот. ин-та АН СССР, сер. 1, 4: 226. — *Psilantha arundinacea* (L.) Tzvel. 1968, Бот. журн. 53, 3: 311.

Описан с Востока: «Oriente».

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** ЦК; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЦЗ:** ВЗ: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мерг.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Вост. (юго-вост.) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

114. (205). *Eragrostis* Wolf

1. (1107). *E. nigra* Nees ex Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 267; Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 314.

Описан из Индии.

ЗЗ: Адж. (в г. Батуми, заносный).

Вост. (юг), Южн. Азия.

2. (1108). *E. pilosa* (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 162. — *Poa pilosa* L. 1753, Sp. Pl.: 68.

Описан из Италии.

ЗП; **ВП;** **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т:**

Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Азия.

3. (1109). *E. multicaulis* Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 426; Цвел., 1993, Бот. журн. 78, 10: 94. — *E. pilosa* subsp. *damiensiana* Thell. 1907, Vierteljahr. Naturf. Ges. Zürich, 52: 438 — *E. pilosa* subsp. *multicaulis* (Steud.) Tzvel. 1967, Список раст. Герб. фл. СССР, 17: 45.

Описан из Японии.

ЗЗ: Инг.-Рион. (заносный близ г. Цхалтубо).

Ср. и Вост. Европа (заносный); Сев. (юго-вост.), Вост. Азия.

4. (1110). *E. frankii* С. А. Mey. ex Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 273.

Описан из Северной Америки.

ЗЗ: Адж. (в г. Батуми, заносный).

Сев. Америка.