

3. (1105). *C. squarrosa* (Trin.) Keng, 1934, Sinensia, 5: 156. — *Molinia squarrosa* Trin. 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 105. — *Diplachne squarrosa* (Trin.) Maxim. 1879, Bull. Soc. Nat. Moscou, 54, 1: 71, in adnot.

Описан из Средней Азии. Lectotypus (Tzvelev, 1976: 629): «In deserto Kirghisi occidentali, С. А. Meyer» (LE).

**ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.

Вост. (юг) Европа; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия.

### 113. (204). *Boriskellera* Terechov

1. (1106). *B. arundinacea* (L.) Terechov, 1938, Delect. Sem. Hort. Bot. Kujbyshev: 13; Цвелев, 1993, Бот. журн. 78, 10: 94. — *Aira arundinacea* L. 1753, Sp. Pl.: 64. — *Eragrostis collina* Trin. 1830, Mém. Acad. Sci. Pétersb., ser. 6, 1: 413. — *Poa tatarica* Fisch. ex Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 382. — *Eragrostis arundinacea* (L.) Roshev. 1934, Фл. СССР, 2: 319, non Jedwabn. 1924. — *E. tatarica* (Fisch. ex Griseb.) Nevski, 1937, Тр. Бот. ин-та АН СССР, сер. 1, 4: 226. — *Psilantha arundinacea* (L.) Tzvel. 1968, Бот. журн. 53, 3: 311.

Описан с Востока: «Oriente».

**ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** ЦК; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЦЗ:** ВЗ: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мерг.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Вост. (юго-вост.) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

### 114. (205). *Eragrostis* Wolf

1. (1107). *E. nigra* Nees ex Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 267; Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 314.

Описан из Индии.

**ЗЗ:** Адж. (в г. Батуми, заносный).

Вост. (юг), Южн. Азия.

2. (1108). *E. pilosa* (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 162. — *Poa pilosa* L. 1753, Sp. Pl.: 68.

Описан из Италии.

**ЗП;** **ВП;** **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т:**

Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Азия.

3. (1109). *E. multicaulis* Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 426; Цвел., 1993, Бот. журн. 78, 10: 94. — *E. pilosa* subsp. *damiensiana* Thell. 1907, Vierteljahr. Naturf. Ges. Zürich, 52: 438 — *E. pilosa* subsp. *multicaulis* (Steud.) Tzvel. 1967, Список раст. Герб. фл. СССР, 17: 45.

Описан из Японии.

**ЗЗ:** Инг.-Рион. (заносный близ г. Цхалтубо).

Ср. и Вост. Европа (заносный); Сев. (юго-вост.), Вост. Азия.

4. (1110). *E. frankii* С. А. Mey. ex Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 273.

Описан из Северной Америки.

**ЗЗ:** Адж. (в г. Батуми, заносный).

Сев. Америка.