

2. (1116). **E. coracana** (L.) Gaertn. 1788, Fruct. et Semin. Pl.: 8; Габриэлян, 2004, Фл., растит., раст. рес. Арм.: 14. — *Cynosurus coracanus* L. 1759, Syst. Nat., ed. 10, 2: 875.

Описан из Индии.

**ЗЗ**: Адж.; **ЮЗ**: Ерев. (сел. Масис).

Южн., Юго-Вост. Азия; Сев., Центр. Африка.

3. (1117). **E. tristachya** (Lam.) Lam. 1791, Tabl. Encycl. Meth. Bot. 1: 203. — *Cynosurus tristachyus* Lam. 1786, Encycl. Meth. Bot. 2: 188.

Описан из Парагвая.

**ЗЗ**: Абх. (в г. Сухуми), Адж. (окр. Кобулет); **Т** (окр. Ленкорани).

Сев., Центр., Южн. Америка.

#### 116. (207). **Chloris** Sw.

1. (1118). **C. virgata** Sw. 1797, Fl. Ind. Occ. 1: 203.

Описан с Антильских островов.

**ВК**: Ман.-Самур.; **ВЗ**: Ширв. (заносный в Баку).

Южн. Европа; Сев. (юго-вост.), Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев., Центр., Южн. Америка.

#### 117. (208). **Cynodon** Rich.

1. (1119). **C. dactylon** (L.) Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 85. — *Panicum dactylon* L. 1753, Sp. Pl.: 58.

Описан из Южной Европы.

**ЗП**; **ВП**; **ЗК**; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**; **ЗЗ**; **ЦЗ**; **ВЗ**; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**; **Т**.

Атл., Центр., Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн., Юго-Вост. Азия; Африка; Америка; Австралия.

#### 118. (209). **Muhlenbergia** Schreb.

1. (1120). **M. schreberi** J. F. Gmel. 1791, Syst. Nat. 2: 171.

Описан из США (штат Пенсильвания).

**ЦК**: В. Тер. (сел. Михайловское в Сев. Осетии); **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх. (заносный, натурализовавшийся).

Сев. Америка.

#### 119. (210). **Sporobolus** R. Br.

1. (1121). **S. fertilis** (Steud.) Clayt. 1965, Kew Bull., 19, 2: 291. — *Agrostis fertilis* Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 170. — *Sporobolus indicus* auct. non R. Br.: Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 163.

Описан из Японии.

**ЗЗ**: Абх., Адж. (заносный, натурализовавшийся).

Южн., Юго-Вост. Азия.

#### 120. (211). **Crypsis** Ait.

1. (1122). **C. alopecuroides** (Pill. et Mitt.) Schrad. 1806, Fl. Germ. 1: 167. — *Phleum alopecuroides* Pill. et Mitt. 1783, Iter Posegan.: 147, tab. 16. — *Heleochloa alopecuroides* (Pill. et Mitt.) Host ex Roem. 1809, Collect.: 233.

Описан из Чехословакии.

**ЗП; ВП; ЗК; ВК; ЗЗ:** Адж. (по р. Чорох); **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Араг. (окр. пос. Гукасян).

Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. (юго-зап.), Ср. Азия; Сев. Африка.

2. (1123). **C. schoenoides** (L.) Lam. 1791, Tabl. Encycl. Meth. Bot. 1: 166. — *Phleum schoenoides* L. 1753, Sp. Pl.: 60. — *Heleochloa schoenoides* (L.) Host ex Roem. 1809, Collect.: 133.

Описан из Средиземноморья.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ:** Туап.-Адж.; **ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз., Сев. (юго-зап.), Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев., Центр. (Мадагаскар) Африка.

3. (1124). **C. turkestanica** Eig, 1929, Agr. Rec. Inst. Agric. a. Nat. Hist. Tel-Aviv, 2: 206.

Описан из Средней Азии.

**ВЗ:** Ширв.

Вост. Европа (юго-вост.); Ср., Центр. (Джунгария) Азия.

4. (1125). **C. faktorovskyi** Eig, 1927, Bull. Zion. Org. Inst. Agric. a. Nat. Hist. Tel-Aviv, 6: 58; Габриэлян, 2004, Фл., растит. и раст. рес. Арм. 15: 14.

Описан из Израиля (окр. Тель-Авива).

**ЮЗ:** Ерев.

Юго-Зап., Ср. Азия.

5. (1126). **C. aculeata** (L.) Ait. 1789, Hort. Kew. 1: 48. — *Schoenus aculeatus* L. 1753, Sp. Pl.: 42.

Описан из Средиземноморья.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Центр., Южн., Вост. (юг) Европа; Средиз.; Сев. (юго-зап.), Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка.

### 121. (212). *Tragus* Hall.

1. (1127). **T. racemosus** (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 2: 241. — *Cenchrus racemosus* L. 1753, Sp. Pl.: 1049.

Описан из Южной Европы.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Центр., Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап.; Ср. (зап.) Азия; Сев. Африка.

### Tribus 12. *Panicaceae* R. Br.

### 122. (213). *Oplismenus* Beauv.

1. (1128). **O. compositus** (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 54; Мусаев, 1991, Злаки Азерб.: 249. — *Panicum compositum* L. 1753, Sp. Pl.: 57.

Описан с о. Шри-Ланка.

**Т.**

Юго-Зап. (сев. Иран), Южн., Юго-Вост. Азия; Центр., Южн. Африка; Центр., Южн. Америка; Австралия.