

ЗП; ВП; ЗК; ВК; ЗЗ: Адж. (по р. Чорох); **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Араг. (окр. пос. Гукасян).

Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. (юго-зап.), Ср. Азия; Сев. Африка.

2. (1123). **C. schoenoides** (L.) Lam. 1791, Tabl. Encycl. Meth. Bot. 1: 166. — *Phleum schoenoides* L. 1753, Sp. Pl.: 60. — *Heleocholea schoenoides* (L.) Host ex Roem. 1809, Collect.: 133.

Описан из Средиземноморья.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ: Туап.-Адж.; **ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз., Сев. (юго-зап.), Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев., Центр. (Мадагаскар) Африка.

3. (1124). **C. turkestanica** Eig, 1929, Agr. Rec. Inst. Agric. a. Nat. Hist. Tel-Aviv, 2: 206.

Описан из Средней Азии.

ВЗ: Ширв.

Вост. Европа (юго-вост.); Ср., Центр. (Джунгария) Азия.

4. (1125). **C. faktorovskyi** Eig, 1927, Bull. Zion. Org. Inst. Agric. a. Nat. Hist. Tel-Aviv, 6: 58; Габриэлян, 2004, Фл., растит. и раст. рес. Арм. 15: 14.

Описан из Израиля (окр. Тель-Авива).

ЮЗ: Ерев.

Юго-Зап., Ср. Азия.

5. (1126). **C. aculeata** (L.) Ait. 1789, Hort. Kew. 1: 48. — *Schoenus aculeatus* L. 1753, Sp. Pl.: 42.

Описан из Средиземноморья.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Центр., Южн., Вост. (юг) Европа; Средиз.; Сев. (юго-зап.), Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка.

121. (212). *Tragus* Hall.

1. (1127). **T. racemosus** (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 2: 241. — *Cenchrus racemosus* L. 1753, Sp. Pl.: 1049.

Описан из Южной Европы.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Центр., Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап.; Ср. (зап.) Азия; Сев. Африка.

Tribus 12. *Panicaceae* R. Br.

122. (213). *Oplismenus* Beauv.

1. (1128). **O. compositus** (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 54; Мусаев, 1991, Злаки Азерб.: 249. — *Panicum compositum* L. 1753, Sp. Pl.: 57.

Описан с о. Шри-Ланка.

Т.

Юго-Зап. (сев. Иран), Южн., Юго-Вост. Азия; Центр., Южн. Африка; Центр., Южн. Америка; Австралия.