

ЗП; ВП; ЗК; ВК; ЗЗ: Адж. (по р. Чорох); **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Араг. (окр. пос. Гукасян).

Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. (юго-зап.), Ср. Азия; Сев. Африка.

2. (1123). **C. schoenoides** (L.) Lam. 1791, Tabl. Encycl. Meth. Bot. 1: 166. — *Phleum schoenoides* L. 1753, Sp. Pl.: 60. — *Heleocholea schoenoides* (L.) Host ex Roem. 1809, Collect.: 133.

Описан из Средиземноморья.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ: Туап.-Адж.; **ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз., Сев. (юго-зап.), Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев., Центр. (Мадагаскар) Африка.

3. (1124). **C. turkestanica** Eig, 1929, Agr. Rec. Inst. Agric. a. Nat. Hist. Tel-Aviv, 2: 206.

Описан из Средней Азии.

ВЗ: Ширв.

Вост. Европа (юго-вост.); Ср., Центр. (Джунгария) Азия.

4. (1125). **C. faktorovskyi** Eig, 1927, Bull. Zion. Org. Inst. Agric. a. Nat. Hist. Tel-Aviv, 6: 58; Габриэлян, 2004, Фл., растит. и раст. рес. Арм. 15: 14.

Описан из Израиля (окр. Тель-Авива).

ЮЗ: Ерев.

Юго-Зап., Ср. Азия.

5. (1126). **C. aculeata** (L.) Ait. 1789, Hort. Kew. 1: 48. — *Schoenus aculeatus* L. 1753, Sp. Pl.: 42.

Описан из Средиземноморья.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Центр., Южн., Вост. (юг) Европа; Средиз.; Сев. (юго-зап.), Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка.

121. (212). *Tragus* Hall.

1. (1127). **T. racemosus** (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 2: 241. — *Cenchrus racemosus* L. 1753, Sp. Pl.: 1049.

Описан из Южной Европы.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Центр., Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап.; Ср. (зап.) Азия; Сев. Африка.

Tribus 12. *Panicaceae* R. Br.

122. (213). *Oplismenus* Beauv.

1. (1128). **O. compositus** (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 54; Мусаев, 1991, Злаки Азерб.: 249. — *Panicum compositum* L. 1753, Sp. Pl.: 57.

Описан с о. Шри-Ланка.

Т.

Юго-Зап. (сев. Иран), Южн., Юго-Вост. Азия; Центр., Южн. Африка; Центр., Южн. Америка; Австралия.

2. (1129). **O. undulatifolius** (Ard.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 54. — *Panicum undulatifolium* Ard. 1764, Animadv. Bot. Spec. Alt.: 14, tab. 4.

Описан из Италии.

ВК: Ман.-Самур. (низовья Самура), Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек.; **Т.**

Центр., Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Южн. (Гималаи) Азия.

3. (1130). **O. burmannii** (Retz.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 54. — *Panicum burmannii* Retz. 1789, Obs. Bot. 3: 10.

Описан из Восточной Индии.

ЗЗ: Адж. (заносный).

Юго-Вост., Южн. Азия.

123. (214). *Dichanthelium* (Hitchc. et E. Chase) Gould

1. (1131). **D. lindheimeri** (Nash) Gould, 1974, Brittonia, 26, 1: 60. — *Panicum lindheimeri* Nash, 1897, Bull. Torrey Bot. Club, 24: 196. — *P. lanuginosum* var. *lindheimeri* (Nash) Fern. 1934, Rhodora, 36: 77.

Описан из Северной Америки.

ЗЗ: Абх., Адж. (заносный).

Сев. Америка.

124. (215). *Panicum* L.

1. (1132). **P. dichotomiflorum** Michx. 1803, Fl. Bor. Amer. 1: 48.

Описан из Северной Америки.

ЗП: Аз-Куб. (окр. Краснодар, заносный); **СЗЗ; ЗЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек.; **Т** (заносный, натурализовавшийся).

Сев., Центр. Америка.

2. (1133). **P. sumatrense** Roth ex Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg. 2: 434. — *P. miliare* auct. non Lam.: Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 37.

Описан с о. Суматра.

ЗЗ; Т (заносный).

Южн., Юго-Вост. Азия.

3. (1134). **P. miliaceum** L. 1753, Sp. Pl.: 58.

Описан из Индии.

3а. **P. miliaceum** L. subsp. **miliaceum**.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Европа; Азия; Сев. Америка; родина, вероятно, Центр., Вост. Азия.

3б. **P. miliaceum** L. subsp. **ruderale** (Kitag.) Tzvel. 1968, Новости сист. высш. раст. 1968: 18. — *P. miliaceum* var. *ruderale* Kitag. 1937, Bot. Mag. Tokyo, 51: 153. — *P. spontaneum* Lyssov ex Zhuk. 1950, Культ. раст. и их сород.: 148.

Описан из Северного Китая.

ВП; ВК (заносный).

Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр., Вост. Азия.