

2. (1129). **O. undulatifolius** (Ard.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 54. — *Panicum undulatifolium* Ard. 1764, Animadv. Bot. Spec. Alt.: 14, tab. 4.

Описан из Италии.

ВК: Ман.-Самур. (низовья Самура), Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек.; **Т.**

Центр., Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Южн. (Гималаи) Азия.

3. (1130). **O. burmannii** (Retz.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 54. — *Panicum burmannii* Retz. 1789, Obs. Bot. 3: 10.

Описан из Восточной Индии.

ЗЗ: Адж. (заносный).

Юго-Вост., Южн. Азия.

123. (214). **Dichanthelium** (Hitchc. et E. Chase) Gould

1. (1131). **D. lindheimeri** (Nash) Gould, 1974, Brittonia, 26, 1: 60. — *Panicum lindheimeri* Nash, 1897, Bull. Torrey Bot. Club, 24: 196. — *P. lanuginosum* var. *lindheimeri* (Nash) Fern. 1934, Rhodora, 36: 77.

Описан из Северной Америки.

ЗЗ: Абх., Адж. (заносный).

Сев. Америка.

124. (215). **Panicum** L.

1. (1132). **P. dichotomiflorum** Michx. 1803, Fl. Bor. Amer. 1: 48.

Описан из Северной Америки.

ЗП: Аз-Куб. (окр. Краснодар, заносный); **СЗЗ; ЗЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек.; **Т** (заносный, натурализовавшийся).

Сев., Центр. Америка.

2. (1133). **P. sumatrense** Roth ex Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg. 2: 434. — *P. miliare* auct. non Lam.: Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 37.

Описан с о. Суматра.

ЗЗ; Т (заносный).

Южн., Юго-Вост. Азия.

3. (1134). **P. miliaceum** L. 1753, Sp. Pl.: 58.

Описан из Индии.

3а. **P. miliaceum** L. subsp. **miliaceum**.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Европа; Азия; Сев. Америка; родина, вероятно, Центр., Вост. Азия.

3б. **P. miliaceum** L. subsp. **ruderale** (Kitag.) Tzvel. 1968, Новости сист. высш. раст. 1968: 18. — *P. miliaceum* var. *ruderale* Kitag. 1937, Bot. Mag. Tokyo, 51: 153. — *P. spontaneum* Lyssov ex Zhuk. 1950, Культ. раст. и их сород.: 148.

Описан из Северного Китая.

ВП; ВК (заносный).

Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр., Вост. Азия.

4. (1135). **P. capillare** L. 1753, Sp. Pl.: 58.

Описан из Северной Америки.

4а. **P. capillare** L. subsp. **capillare**.

ЗП: Аз.-Куб. (окр. Краснодар); **ВК**: Кубин. (окр. Кубы); **ЗЗ**; **ВЗ**; **ЮЗ**: Нах. (заносный, натурализовавшийся).

Сев. Америка.

4б. **P. capillare** L. subsp. **barbipulvinatum** (Nash) Tzvel. 1968, Новости сист. высш. раст. 1968: 18. — *P. barbipulvinatum* Nash, 1900, Mem. New York Bot. Gard. 1: 21.

Описан из Северной Америки.

ЗП; **ВП** (заносный, натурализовавшийся).

Сев. Америка.

125. (216). **Echinochloa** Beauv.

1. (1136). **E. spiralis** Vasing. 1934, Фл. СССР, 2: 34, 739. — *E. crusgalli* subsp. *spiralis* (Vasing.) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 662.

Описан из Западного Предкавказья. Ту р и с: «Долина Кубани в 60 км к сев.-зап. от Краснодара, 28. 10. 1931, А. Вазингер» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб. (по Кубани); **ВП**: Тер.-Сулак.; **ВК**: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ**; **ВЗ**: Н. Кур.; **Т**.

Южн., Вост. (юг) Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Южн., Юго-Вост. Азия; Африка; Америка (?).

2. (1137). **E. crusgalli** (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 161. — *Panicum crusgalli* L. 1753, Sp. Pl.: 56.

Описан из Европы и Северной Америки.

ЗП; **ВП**; **ЗК**; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**; **ЗЗ**; **ЦЗ**; **ВЗ**; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**; **Т**.

Европа; Азия; Африка; Америка; Австралия.

3. (1138). **E. oryzicola** (Vasing.) Vasing. 1934, Фл. СССР, 2: 33; Цвел., 1993, Бот. журн. 78, 10: 95. — *E. crusgalli* proles *oryzicola* Vasing. 1931, Тр. прикл. бот. сел. 25, 4: 125. — *E. phyllopogon* subsp. *oryzicola* (Vasing.) Kossenko, 1940, Бот. мат. (Ленинград) 8, 12: 210. — *E. phyllopogon* auct. non (Stapf) Kossenko: Цвел. 1976, Злаки СССР: 664.

Описан с Дальнего Востока.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК**: Бело-Лаб.; **Т**.

Южн., Вост. (юг) Европа; Сев. (юго-вост.), Юго-Зап. (Иран), Ср., Вост., Южн., Юго-Вост. Азия.

4. (1139). **E. oryzoides** (Ard.) Fritsch, 1891, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 41: 742. — *Panicum oryzoides* Ard. 1764, Animadv. Bot. 2: 16. — *P. hostii* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 56. — *Echinochloa macrocarpa* Vasing. 1934, Фл. СССР, 2: 34, 739. — *E. coarctata* Kossenko, 1941, Бот. мат. (Ленинград) 9, 1: 28. — *E. hostii* (Bieb.) Boros ex Holub, 1964, Preslia, 36, 3: 253.

Описан по экземплярам, выращенным в Италии из зерновок неизвестного происхождения.