

4. (1135). **P. capillare** L. 1753, Sp. Pl.: 58.

Описан из Северной Америки.

4а. **P. capillare** L. subsp. **capillare**.

**ЗП**: Аз.-Куб. (окр. Краснодар); **ВК**: Кубин. (окр. Кубы); **ЗЗ**; **ВЗ**; **ЮЗ**: Нах. (заносный, натурализовавшийся).

Сев. Америка.

4б. **P. capillare** L. subsp. **barbipulvinatum** (Nash) Tzvel. 1968, Новости сист. высш. раст. 1968: 18. — *P. barbipulvinatum* Nash, 1900, Mem. New York Bot. Gard. 1: 21.

Описан из Северной Америки.

**ЗП**; **ВП** (заносный, натурализовавшийся).

Сев. Америка.

## 125. (216). **Echinochloa** Beauv.

1. (1136). **E. spiralis** Vasing. 1934, Фл. СССР, 2: 34, 739. — *E. crusgalli* subsp. *spiralis* (Vasing.) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 662.

Описан из Западного Предкавказья. Ту р и с: «Долина Кубани в 60 км к сев.-зап. от Краснодара, 28. 10. 1931, А. Вазингер» (LE!).

**ЗП**: Аз.-Куб. (по Кубани); **ВП**: Тер.-Сулак.; **ВК**: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ**; **ВЗ**: Н. Кур.; **Т**.

Южн., Вост. (юг) Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Южн., Юго-Вост. Азия; Африка; Америка (?).

2. (1137). **E. crusgalli** (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 161. — *Panicum crusgalli* L. 1753, Sp. Pl.: 56.

Описан из Европы и Северной Америки.

**ЗП**; **ВП**; **ЗК**; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**; **ЗЗ**; **ЦЗ**; **ВЗ**; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**; **Т**.

Европа; Азия; Африка; Америка; Австралия.

3. (1138). **E. oryzicola** (Vasing.) Vasing. 1934, Фл. СССР, 2: 33; Цвел., 1993, Бот. журн. 78, 10: 95. — *E. crusgalli* proles *oryzicola* Vasing. 1931, Тр. прикл. бот. сел. 25, 4: 125. — *E. phyllopogon* subsp. *oryzicola* (Vasing.) Kossenko, 1940, Бот. мат. (Ленинград) 8, 12: 210. — *E. phyllopogon* auct. non (Stapf) Kossenko: Цвел. 1976, Злаки СССР: 664.

Описан с Дальнего Востока.

**ЗП**: Аз.-Куб.; **ЗК**: Бело-Лаб.; **Т**.

Южн., Вост. (юг) Европа; Сев. (юго-вост.), Юго-Зап. (Иран), Ср., Вост., Южн., Юго-Вост. Азия.

4. (1139). **E. oryzoides** (Ard.) Fritsch, 1891, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 41: 742. — *Panicum oryzoides* Ard. 1764, Animadv. Bot. 2: 16. — *P. hostii* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 56. — *Echinochloa macrocarpa* Vasing. 1934, Фл. СССР, 2: 34, 739. — *E. coarctata* Kossenko, 1941, Бот. мат. (Ленинград) 9, 1: 28. — *E. hostii* (Bieb.) Boros ex Holub, 1964, Preslia, 36, 3: 253.

Описан по экземплярам, выращенным в Италии из зерновок неизвестного происхождения.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЗЗ;** **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур.; **Т:** Центр., Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн., Юго-Вост. Азия.

5. (1140). **E. caudata** Roshev. 1934, Фл. СССР, 2: 35. — *E. crusgalli* subsp. *caudata* (Roshev.) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 662.

Описан из Забайкалья.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Вост. (юго-вост.) Европа; Сев. (юг), Ср., Центр., Вост. Азия.

### 126. (217). *Brachiaria* (Trin.) Griseb.

1. (1141). **B. eruciformis** (Smith) Griseb. 1853, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 469. — *Panicum eruciforme* Smith, 1806, in Sibth. et Smith, Fl. Graec. Prodr. 1: 40, tab. 59. — *P. caucasicum* Trin. 1834, Mem. Acad. Sci. Petersb., ser. 6,3,2, Sci. Nat. 1: 237.

Описан из Греции.

**ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг.

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. и Ср. Азия.

### 127. (218). *Eriochloa* Kunth

1. (1142). **E. succincta** (Trin.) Kunth, 1833, Enum. Pl. 1: 73. — *Paspalum succinctum* Trin. 1826, Gram. Panic.: 119.

Описан из дельты Волги. Тур у s: «Astrachan, 1817, leg. Blume» (LE!).

**ВП:** Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мерг.-Зан., Ю. Караб.

Вост. Европа (юго-вост.); Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

2. (1143). **E. villosa** (Thunb.) Kunth, 1829, Revis. Gram. 1: 30. — *Paspalum villosum* Thunb. 1784, Fl. Jar.: 45.

Описан из Японии.

**ЗП:** Аз.-Куб. (по Кубани); **ВП;** **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.

Южн., Вост. (юг) Европа; Сев. (юго-вост.), Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр., Юго-Вост., Вост. Азия.

### 128. (219). *Paspalum* L.

#### Sect. 1. *Paspalum*

1. (1144). **P. dilatatum** Poir. 1804, in Lam. Encycl. Meth. Bot. 5: 35; Пробат. 1979, Новости сист. высш. раст. 16: 37.

Описан из Аргентины.

**ЦК:** В. Тер.; **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев. (заноный, натурализовавшийся).

Южн. Америка.

2. (1145). **P. thunbergii** Kunth ex Steud. 1854, Syn., Pl. Glum. 1: 28. — *P. scrobiculatum* auct. non L.: Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 678.