

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЗЗ;** **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур.; **Т:** Центр., Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн., Юго-Вост. Азия.

5. (1140). **E. caudata** Roshev. 1934, Фл. СССР, 2: 35. — *E. crusgalli* subsp. *caudata* (Roshev.) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 662.

Описан из Забайкалья.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Вост. (юго-вост.) Европа; Сев. (юг), Ср., Центр., Вост. Азия.

126. (217). *Brachiaria* (Trin.) Griseb.

1. (1141). **B. eruciformis** (Smith) Griseb. 1853, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 469. — *Panicum eruciforme* Smith, 1806, in Sibth. et Smith, Fl. Graec. Prodr. 1: 40, tab. 59. — *P. caucasicum* Trin. 1834, Mem. Acad. Sci. Petersb., ser. 6,3,2, Sci. Nat. 1: 237.

Описан из Греции.

ЗЗ: Абх.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг.

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. и Ср. Азия.

127. (218). *Eriochloa* Kunth

1. (1142). **E. succincta** (Trin.) Kunth, 1833, Enum. Pl. 1: 73. — *Paspalum succinctum* Trin. 1826, Gram. Panic.: 119.

Описан из дельты Волги. Тур у s: «Astrachan, 1817, leg. Blume» (LE!).

ВП: Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мерг.-Зан., Ю. Караб.

Вост. Европа (юго-вост.); Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

2. (1143). **E. villosa** (Thunb.) Kunth, 1829, Revis. Gram. 1: 30. — *Paspalum villosum* Thunb. 1784, Fl. Jar.: 45.

Описан из Японии.

ЗП: Аз.-Куб. (по Кубани); **ВП;** **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.

Южн., Вост. (юг) Европа; Сев. (юго-вост.), Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр., Юго-Вост., Вост. Азия.

128. (219). *Paspalum* L.

Sect. 1. *Paspalum*

1. (1144). **P. dilatatum** Poir. 1804, in Lam. Encycl. Meth. Bot. 5: 35; Пробат. 1979, Новости сист. высш. раст. 16: 37.

Описан из Аргентины.

ЦК: В. Тер.; **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев. (зано́сный, натурализовавшийся).

Южн. Америка.

2. (1145). **P. thunbergii** Kunth ex Steud. 1854, Syn., Pl. Glum. 1: 28. — *P. scrobiculatum* auct. non L.: Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 678.

Описан из Японии.

ЦК: В. Тер.; **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ВЗ:** Ширв. (окр. Баку); **Т** (заносный, натурализовавшийся).

Вост., Юго-Вост. Азия; заносный во многих странах.

3. (1146). **P. setaceum** Michx. 1803, Fl. Bor. Amer. 1: 43.

Описан из Северной Америки.

ЗЗ: Туап.-Адл. (окр. Сочи), Абх. (окр. пос. Кодори), заносный.

Сев. Америка.

Sect. 2. *Diplostachys* (Steud.) Tzvel.

4. (1147). **P. paspalodes** (Michx.) Scribn. 1894, Mem. Torrey Bot. Club, 5: 29; Цвел., 1976, Злаки СССР: 669; Габриэлян, 2004, Фл., растит., раст. рес. Арм.: 13. — *Digitaria paspalodes* Michx. 1803, Fl. Bor. Amer. 1: 46. — *Paspalum digitaria* Poir. 1816, in Lam. Encycl. Meth. Bot., Suppl. 4: 316. — *P. distichum* auct. non L.: Цвел. 1963, Бот. мат. (Ленинград) 22: 3.

Описан из Северной Америки.

СЗЗ; **ЗЗ;** **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т** (заносный, натурализовавшийся).

Сев., Центр. Америка.

129. (220). *Digitaria* Hall.

Sect. 1. *Digitaria* Hall.

1. (1148). **D. ciliaris** (Retz.) Koel. 1802, Descr. Gram. Gallia, Germ.: 27, quoad nom. — *Panicum ciliare* Retz. 1786, Obs. Bot. 4: 16. — *P. adscendens* Kunth, 1816, Nova Gen. et Sp. 1: 97. — *Digitaria adscendens* (Kunth) Henrard, 1934, Blumea, 1: 92.

Описан по материалам с о. Ява и из Китая.

СЗЗ; **ЗЗ;** **Т** (заносный, натурализовавшийся).

Южн. Европа; Юго-Зап., Вост., Южн., Юго-Вост. Азия; Африка; Америка; Австралия.

2. (1149). **D. horizontalis** Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol.: 92.

Описан с Антильских о-вов.

ВК: Кубин.; **ЗЗ;** **ЮЗ:** Нах.; **Т** (заносный, натурализовавшийся).

Южн. Европа; Юго-Зап., Вост., Юго-Вост. Азия; Африка; Америка; Австралия.

3. (1150). **D. sanguinalis** (L.) Scop. 1772, Fl. Carn., ed. 2, 1: 52. — *Panicum sanguinale* L. 1753, Sp. Pl.: 57.

Описан из Южной Европы.

ЗП; **ВП;** **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т.**

Европа; Азия; Африка; Америка; Австралия.

4. (1151). **D. pectiniformis** (Henrard) Tzvel. 1963, Бот. мат. (Ленинград) 22: 60, р. р. — *D. sanguinalis* subsp. *pectiniformis* Henrard, 1934, Blumea, 1: 93. — *D. ciliaris* auct. non (Retz.) Koel.: Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 30; Зернов, 2002, Опред. сосуд. раст. сев. Росс. Причерн.: 49.