

A. Camus, 1923, Not. Syst. (Paris), 4,2: 48, non Hornem. 1819. — *D. longiflora* auct. non Pers.: Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 29.

Описан из Бразилии.

**ЗЗ; ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур.; **Т** (заносный, натурализовавшийся).

Юго-Зап., Вост., Юго-Вост., Южн. Азия; Африка; Америка; Австралия.

### 130. (221). *Setaria* Beauv.

#### Sect. 1. *Setaria*

1. (1157). **S. viridis** (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 51. — *Panicum viride* L. 1759, Syst. Nat. ed. 10. 2: 870. — *Setaria weinmannii* Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg. 2: 490.

Описан из Центральной Европы.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Европа; Азия; Африка; Сев. Америка; заносный в Южн. Америке и Австралии.

Из разновидностей отметим *Setaria viridis* var. *weinmannii* (Roem. et Schult.) Borb. (1878, Math. Term.-Tud. Közl. 15: 310. — *S. weinmannii* Roem. et Schult. l. c.) с фиолетовыми щетинками, и var. *brevisetata* (Doell) Hitchc. (1906, Rhodora, 8: 210. — *S. glareosa* V. Petr. l. c.) с зелеными щетинками не более чем в 1.5 раза длиннее колосков.

2. (1158). **S. pachystachys** (Franch. et Savat.) Matsum. 1897, Bot. Mag. Tokyo, 11: 443. — *Panicum pachystachys* Franch. et Savat. 1879, Enum. Pl. Jap. 2: 594. — *Setaria viridis* subsp. *pachystachys* (Franch. et Savat.) Masam. et Yanag. 1941, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 31: 327.

Описан из Японии.

**ЗЗ; Т** (заносный, натурализовавшийся).

Вост. Азия.

3. (1159). **S. пусносом** (Steud.) Henrard ex Nakai, 1939, Journ. Jap. Bot. 15: 393. — *Panicum pycnocomum* Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 462. — *P. viride* var. *majus* Gaud. 1811, Agrost. Helv. 1: 18. — *Setaria viridis* var. *major* (Gaud.) Pospich. 1897, Fl. Osterr. Kustenl. 1: 51. — *S. ketzchovellii* Menabde et Eritzjan, 1947, Тр. Тбил. бот. ин-та, сер. 2, 11: 196. — *S. viridis* subsp. *pycnosoma* (Steud.) Tzvel. 1968, Новости сист. высш. раст. 1968: 19.

Описан из Японии.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ; Т** (заносный, натурализовавшийся).

Южн., Вост. Европа; Сев. (юго-вост.), Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия.

4. (1160). **S. italica** (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 51. — *Panicum italicum* L. 1753, Sp. Pl.: 56.

Описан из Индии.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ЮЗ; Т** (заносный, натурализовавшийся).

Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. (юг), Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

5. (1161). **S. germanica** (Mill.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 51. — *Panicum germanicum* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8, sine pag. — *P. italicum* convar. *moharium* Alef. 1866, Landwirtschaft. Fl.: 315. — *Setaria moharica* Menabde et Eritzjan, 1948, Тр. Тбил. бот. ин-та АН Груз. ССР, сер. 2, 12: 166. — *S. italica* convar. *moharia* (Alef.) Mansf. 1952, Der

Züchter, 22, 10–11: 311. — *S. italica* subsp. *moharia* (Alef.) H. Scholz, 1963, in Rothm. Excursionsfl. Deutschl. 4: 23, comb. invalid.

Описан из Германии.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗ; Т.**

Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. (юг), Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

6. (1162). **S. faberi** W. Herrm. 1910, Beitr. Biol. Pflanz. 10: 51. — *S. macrocarpa* Lucznik, 1937, Тр. Дальневост. фил. АН СССР, сер. бот. 2: 879, рис. 1.

Описан из Китая.

**ЗЗ; Т** (заносный).

Вост. Азия.

7. (1163). **S. verticillata** (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 51. — *Panicum verticillatum* L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 82.

Описан из Южной Европы.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

В Закавказье возможны находки близкого вида — *S. adhaerens* (Forsk.) Chiov. — экземпляры с более мелкими колосками и голыми до верхушки влагалищ листьев краями.

8. (1164). **S. verticilliformis** Dumort. 1827, Fl. Belg.: 150; Цвел., 1993, Бот. журн. 78, 10: 95. — *Panicum verticillatum* var. *ambiguum* Guss. 1827, Fl. Sic. Prodr. 80. — *Setaria ambigua* (Guss.) Guss. 1842, Fl. Sic. Syn. 1: 114, non Mérat, 1836. — *S. decipiens* Schimp. 1857, Ber. Deutsch. Naturf. Versamml. 33: 71. — *S. verticillata* var. *ambigua* (Guss.) Parl. 1845, Fl. Palerm. 1: 36.

Описан из Бельгии.

**ЗЗ; Инг.-Рион., Адж.; ВЗ; Н. Кур.; Т.**

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

Вероятно, происходит от гибридизации *S. verticillata* × *S. viridis*. Ось колосовидных метелок у него шероховатая, а не волосистая (как у *S. viridis*), а шипики на щетинках направлены кверху, а не книзу (как у *S. verticillata*).

9. (1165). **S. intermedia** (Roth) Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg. 2: 490.

Описан из Индии.

**ЗЗ; Абх., Адж.** (заносный, натурализовавшийся).

Юго-Зап., Вост., Юго-Вост.; Южн. Азия.

## Sect. 2. *Pennisetoides* Tzvel.

10. (1166). **S. pumila** (Poir.) Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg. 2: 891. — *Panicum pumilum* Poir. 1816, in Lam. Encycl. Meth. Bot. Suppl. 4: 273. — *Setaria glauca* auct. non (L.) Beauv.: Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 39; Цвел. 1976, Злаки СССР: 679.

Описан из Европы.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Европа; Азия; Африка; Америка; Австралия.