

131. (222). *Pennisetum* Rich.

Sect. 1. *Pennisetum*

1. (1167). *P. orientale* Rich. 1805, in Pers., Syn. Pl. 1: 72.

Описан с Востока: «In Oriente».

ВЗ: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мерг.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. (сев.-вост.) Африка.

Sect. 2. *Gymnothrix* (Beauv.) Beauv. ex Hook. f.

2. (1168). *P. alopecuroides* (L.) Spreng. 1825, Syst. Veg. 1: 303; Цвел. 1976, Злаки СССР: 682 — *Panicum alopecuroides* L. 1753, Sp. Pl.: 55. — *Pennisetum villosum* auct. non R. Br.: Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 681.

Описан из Китая.

ЗЗ: Абх. (окр. Сухуми); **ВЗ:** Ширв. (окр. Баку), заносный.

Вост., Юго-Вост. Азия.

Sect. 3. *Penicillaria* (Willd.) Benth. et Hook. f.

3. (1169). *P. americanum* (L.) K. Schum. 1895, in Engler, Pflanzenw. Ost.-Afr. B: 51. — *Panicum americanum* L. 1753, Sp. Pl.: 96.

Описан «из Америки», но, вероятно, из Африки.

ЗП; ЗЗ (культивируемое кормовое растение).

Юго-Зап., Южн. Азия; Африка.

132. (223). *Cenchrus* L.

1. (1170). *C. longispinus* (Hack.) Fern. 1943, Rhodora, 45: 388; Мосякин, 1995, Укр. бот. журн. 52, 1: 124. — *C. echinatus* L. f. *longispina* Hack. 1903, in Кнеуцк. Allg. Bot. Zeitschr. 9: 169. — *C. tribuloides* auct. non L.: Ларионов, 1951, Бот. журн. АН УРСР, 8, 3: 78. — *C. pauciflorus* auct. non Benth.: Цвел. 1976, Злаки СССР: 684.

Описан из Северной Америки.

ЗП: Аз.-Куб. (окр. Краснодар); **ЗЗ:** Абх. (окр. Гагры) (заносный, натурализовавшийся).

Америка.

Tribus 13. *Andropogoneae* Dumort.

133. (224). *Erianthus* Michx.

1. (1171). *E. ravennae* (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 14. — *Andropogon ravennae* L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 1481. — *Saccharum ravennae* (L.) Murray, 1774, Syst. Veg.: 88. — *Erianthus purpurascens* auct. non Anderss.: Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 9.

Описан из Италии.

ВП: Тер.-Кум. (по Тереку); **ЦК; ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ; Т.**

Южн. Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Южн. Азия.