

137. (228). *Sorghum* Moench

Sect. 1. *Blumenbachia* (Koel.) Tzvel.

1. (1176). *S. halepense* (L.) Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 101. — *Holcus halepensis* L. 1753, Sp. Pl.: 1047.

Описан из Сирии и Северной Африки: «In Syria, Mauritania».

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т (заносный, натурализовавшийся).

Атл., Центр., Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап., Ср., Вост., Юго-Вост., Южн. Азия; Сев. Африка.

На Кавказе кроме типовой разновидности var. *halepense* с остистыми колосками, обычна и var. *muticum* (Hack.) Grossh. (1928, Фл. Кавк. 1: 56) с колосками без остей.

Sect. 2. *Sorghum*

2. (1177). *S. sudanense* (Piper) Stapf, 1917, in Prain, Fl. Trop. Afr. 9: 113. — *Andropogon sorghum* Brot. subsp. *sudanensis* Piper, 1915, Proc. Biol. Soc. Washington, 18: 33.

Описан из Судана.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ (в культуре и заносный).

Африка.

3. (1178). *S. technicum* (Koern.) Batt. et Trab. 1895, Fl. Alger (Monocot.) 2: 128; Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 20, 739. — *Andropogon sorghum* L. var. *technicus* Koern. 1873, Syst. Uebers. Ser. Leg.: 20. — *S. saccharatum* convar. *technicum* (Koern.) Tzvel. 1968, Новости сист. высш. раст. 1968: 15.

Описан из Средней Европы.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ВЗ; ЮЗ; Т (в культуре и заносный).

Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. (юг), Юго-Зап., Ср., Вост., Юго-Вост., Южн. Азия; Сев. Африка.

4. (1179). *S. saccharatum* (L.) Moench, 1794, Meth. Pl.: 207. — *Holcus saccharatus* L. 1753, Sp. Pl.: 1047.

Описан из Индии.

ЗП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ВЗ; ЮЗ; Т (в культуре и заносный).

Центр., Южн., Вост (юг) Европа; Ср., Вост., Юго-Вост., Южн. Азия; Сев., Центр. Африка; Сев. Америка.

5. (1180). *S. bicolor* (L.) Moench, 1794, Meth. Pl.: 207. — *Holcus bicolor* L. 1771, Mant. Pl. 2: 301. — *H. sorghum* L. 1753, Sp. Pl.: 1047, s. str. — *Sorghum vulgare* auct. non Pers.: Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 19.

Описан из Ирана: «In Persia».

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗ; Т (в культуре и заносный).

Центр., Южн., Вост. (юг) Европа; Сев. (юго-вост.), Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев., Центр. Африка.

6. (1181). *S. cernuum* (Ard.) Host, 1809, Gram. Austr. 4: 2, tab. 3. — *Holcus cernuus* Ard. 1786, in Saggi, Sci. Lett. Acad. Padova, 1: 128, tab. 3. — *H. sorghum* L. 1753, Sp. Pl.: 1047, p. p. excl. typo. — *Sorghum vulgare* Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 101, s. str.

Описан из Италии.

ЗП; ВП; ЗЗ; ВЗ; ЮЗ; Т (в культуре и заносный).

Центр., Южн., Вост. (юго-вост.) Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев., Центр. Африка.

7. (1182). **S. x derzhavinii** Tzvel. 1968, Новости сист. высш. раст. 1968: 16.

Описан из Ростовской обл. Т у р u s: «Ростовская обл., на полях близ ст. Верблюды, 26 VII 1949, И. Васильченко и др.» (LE!).

ЗП; ВП: В. Ставр. (в культуре).

Вост. Европа (юго-вост.).

Происходит от гибридизации *S. halepense* x *S. saccharatum*.

138. (229). *Chrysopogon* Trin.

1. (1183). **C. gryllus** (L.) Trin. 1820, Fund. Agrost.: 188. — *Andropogon gryllus* L. 1756, Cent. Pl. 2: 33.

Описан из Европы.

ЗК; ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Нах.

Центр. (юго-вост.), Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. Азия.

Для Грузии в качестве культурного ароматического растения приводится вид близкого рода *Vetiveria* Bory — *V. zizanioides* (L.) Nash.

139. (230). *Bothriochloa* Kuntze

1. (1184). **B. caucasica** (Trin.) C. E. Hubb. 1939, Kew Bull. 1939: 101. — *Andropogon caucasicus* Trin. 1832, Mém. Acad. Sci. Pétersb., ser. 6, 2: 286. — *A. intermedius* var. *caucasicus* (Trin.) Hack. 1889, in DC. et A. DC. Monogr. Phaner. 6: 486. — *Bothriochloa bladhii* auct. non (Retz.) S. T. Blake: R. R. Mill, 1985, in P. H. Davis, Fl. Turk. 9: 611, p. p.

Описан с Кавказа. Т у р u s: «Cauc. orient. 1827, leg. Wilhelms» (LE!).

ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗ: Мерп.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Зап., Ср. Азия.

Очень близок широко распространенному в тропиках и субтропиках Южной Азии виду *B. bladhii* (Retz.) S. T. Blake (= *B. intermedia* (R. Br.) A. Camus).

2. (1185). **B. ischaemum** (L.) Keng, 1936, Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China (Bot.) 10, 2: 201. — *Andropogon ischaemum* L. 1753, Sp. Pl.: 1047.

Описан из Южной Европы.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Центр. (юг), Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия.

140. (231). *Andropogon* L.

1. (1186). **A. virginicus** L. 1753, Sp. Pl.: 1046.

Описан из Северной Америки.

СЗЗ: Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх. (заносный).

Сев. Америка.

141. (232). *Arthraxon* Beauv.

1. (1187). **A. hispidus** (Thunb.) Makino, 1912, Bot. Mag. Tokyo, 26: 214. — *Phalaris hispida* Thunb. 1784, Fl. Jap.: 44.

Описан из Японии.