

**ЗП; ВП; ЗЗ; ВЗ; ЮЗ; Т** (в культуре и заносный).

Центр., Южн., Вост. (юго-вост.) Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев., Центр. Африка.

7. (1182). **S. x derzhavinii** Tzvel. 1968, Новости сист. высш. раст. 1968: 16.

Описан из Ростовской обл. Т у р u s: «Ростовская обл., на полях близ ст. Верблюды, 26 VII 1949, И. Васильченко и др.» (LE!).

**ЗП; ВП:** В. Ставро. (в культуре).

Вост. Европа (юго-вост.).

Происходит от гибридизации *S. halepense* x *S. saccharatum*.

### 138. (229). *Chrysopogon* Trin.

1. (1183). **C. gryllus** (L.) Trin. 1820, Fund. Agrost.: 188. — *Andropogon gryllus* L. 1756, Cent. Pl. 2: 33.

Описан из Европы.

**ЗК; ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Нах.

Центр. (юго-вост.), Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. Азия.

Для Грузии в качестве культурного ароматического растения приводится вид близкого рода *Vetiveria* Bory — *V. zizanioides* (L.) Nash.

### 139. (230). *Bothriochloa* Kuntze

1. (1184). **B. caucasica** (Trin.) C. E. Hubb. 1939, Kew Bull. 1939: 101. — *Andropogon caucasicus* Trin. 1832, Mém. Acad. Sci. Pétersb., ser. 6, 2: 286. — *A. intermedius* var. *caucasicus* (Trin.) Hack. 1889, in DC. et A. DC. Monogr. Phaner. 6: 486. — *Bothriochloa bladhii* auct. non (Retz.) S. T. Blake: R. R. Mill, 1985, in P. H. Davis, Fl. Turk. 9: 611, p. p.

Описан с Кавказа. Т у р u s: «Cauc. orient. 1827, leg. Wilhelms» (LE!).

**ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗ:** Мерп.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Зап., Ср. Азия.

Очень близок широко распространенному в тропиках и субтропиках Южной Азии виду *B. bladhii* (Retz.) S. T. Blake (= *B. intermedia* (R. Br.) A. Camus).

2. (1185). **B. ischaemum** (L.) Keng, 1936, Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China (Bot.) 10, 2: 201. — *Andropogon ischaemum* L. 1753, Sp. Pl.: 1047.

Описан из Южной Европы.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Центр. (юг), Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия.

### 140. (231). *Andropogon* L.

1. (1186). **A. virginicus** L. 1753, Sp. Pl.: 1046.

Описан из Северной Америки.

**СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх. (заносный).

Сев. Америка.

### 141. (232). *Arthraxon* Beauv.

1. (1187). **A. hispidus** (Thunb.) Makino, 1912, Bot. Mag. Tokyo, 26: 214. — *Phalaris hispida* Thunb. 1784, Fl. Jap.: 44.

Описан из Японии.