

ЗП; ВП; ЗЗ; ВЗ; ЮЗ; Т (в культуре и заносный).

Центр., Южн., Вост. (юго-вост.) Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев., Центр. Африка.

7. (1182). **S. x derzhavinii** Tzvel. 1968, Новости сист. высш. раст. 1968: 16.

Описан из Ростовской обл. Т у р u s: «Ростовская обл., на полях близ ст. Верблюды, 26 VII 1949, И. Васильченко и др.» (LE!).

ЗП; ВП: В. Ставро. (в культуре).

Вост. Европа (юго-вост.).

Происходит от гибридизации *S. halepense* x *S. saccharatum*.

138. (229). *Chrysopogon* Trin.

1. (1183). **C. gryllus** (L.) Trin. 1820, Fund. Agrost.: 188. — *Andropogon gryllus* L. 1756, Cent. Pl. 2: 33.

Описан из Европы.

ЗК; ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Нах.

Центр. (юго-вост.), Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. Азия.

Для Грузии в качестве культурного ароматического растения приводится вид близкого рода *Vetiveria* Bory — *V. zizanioides* (L.) Nash.

139. (230). *Bothriochloa* Kuntze

1. (1184). **B. caucasica** (Trin.) C. E. Hubb. 1939, Kew Bull. 1939: 101. — *Andropogon caucasicus* Trin. 1832, Mém. Acad. Sci. Pétersb., ser. 6, 2: 286. — *A. intermedius* var. *caucasicus* (Trin.) Hack. 1889, in DC. et A. DC. Monogr. Phaner. 6: 486. — *Bothriochloa bladhii* auct. non (Retz.) S. T. Blake: R. R. Mill, 1985, in P. H. Davis, Fl. Turk. 9: 611, p. p.

Описан с Кавказа. Т у р u s: «Cauc. orient. 1827, leg. Wilhelms» (LE!).

ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗ: Мерп.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Зап., Ср. Азия.

Очень близок широко распространенному в тропиках и субтропиках Южной Азии виду *B. bladhii* (Retz.) S. T. Blake (= *B. intermedia* (R. Br.) A. Camus).

2. (1185). **B. ischaemum** (L.) Keng, 1936, Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China (Bot.) 10, 2: 201. — *Andropogon ischaemum* L. 1753, Sp. Pl.: 1047.

Описан из Южной Европы.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Центр. (юг), Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия.

140. (231). *Andropogon* L.

1. (1186). **A. virginicus** L. 1753, Sp. Pl.: 1046.

Описан из Северной Америки.

СЗЗ: Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх. (заносный).

Сев. Америка.

141. (232). *Arthraxon* Beauv.

1. (1187). **A. hispidus** (Thunb.) Makino, 1912, Bot. Mag. Tokyo, 26: 214. — *Phalaris hispida* Thunb. 1784, Fl. Jap.: 44.

Описан из Японии.

1а. *A. hispidus* (Thunb.) Makino subsp. *hispidus*.

ЗЗ: Абх., Адж.

Вост. Азия.

1б. *A. hispidus* (Thunb.) Makino subsp. *langsdorffii* (Trin.) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 705. — *Pleuroplitis langsdorffii* Trin. 1820, Fund. Agrost.: 175. — *Arthraxon langsdorffii* (Trin.) Hochst. ex Roshev. 1934, Фл. СССР, 2: 13, s. str.

Описан из Японии.

ЗЗ; ВЗ: Алаз.-Агрнич. (окр. г. Нуха), Н. Кур.; ЮЗ: Севан. (юго-вост.), заносный. Сев. (юго-вост.), Юго-Зап., Ср., Вост. Азия.

1с. *A. hispidus* (Thunb.) Makino subsp. *centrasiaticus* (Griseb.) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 705. — *Pleuroplitis centrasiatica* Griseb. 1853, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 477. — *Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino var. *centrasiaticus* (Griseb.) Honda, 1925, Bot. Mag. Tokyo, 39: 278. — *A. centrasiaticus* (Griseb.) Gamajun. 1948, Определ. злаков Казахстана: 10.

Описан из Восточного Казахстана.

ЦК: Малк.; Т (заносный, натурализовавшийся).

Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр., Вост. Азия.

1д. *A. hispidus* (Thunb.) Makino subsp. *caucasicus* (Rupr. ex Regel) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 706. — *Pleuroplitis langsdorffii* var. *caucasica* Rupr. ex Regel, 1866, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 10: 373. — *Arthraxon caucasicus* (Rupr. ex Regel) Tzvel. 1963, Бот. мат. (Ленинград) 22: 55.

Описан из Восточного Закавказья. Турus: «Kachetia, inter Quareli et Sarchenis, 23 VIII 1860, F. Ruprecht» (LE!).

ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗ: Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; Т (заносный, натурализовавшийся).

Юго-Зап. Азия.

142. (233). *Hemarthria* R. Br.

1. (1188). *H. altissima* (Poir.) Stapf et C. E. Hubb. 1934, Kew Bull. 3: 109. — *Rotboellia altissima* Poir. 1789, Voy. Barb. 2: 105. — *R. fasciculata* Lam. 1791, Tabl. Encycl. Meth. Bot. 1: 204. — *Hemarthria fasciculata* (Lam.) Kunth, 1829, Revis. Gram. 1: 153; Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 12.

Описан из Северной Африки.

ЗЗ: Адж. (заносный, натурализовавшийся).

Южн. Европа; Юго-Зап., Южн. Азия.

143. (234). *Zea* L.

1. (1189). *Z. mays* L. 1753, Sp. Pl.: 971.

Описан из Америки.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Культивируется, но часто встречается как заносный у дорог.