

20. (111). *Taeniatherum* Nevski

1. (696). *T. asperum* (Simonk.) Nevski, 1934, Тр. Среднеаз. ун-та сер. 8в, 17: 38. — *Cuviera caput-medusae* var. *aspera* Simonk. 1897, Term.-Tud. Közl. 29: 230. — *Taeniatherum caput-medusae* subsp. *asperum* (Simonk.) Melderis, 1984, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 42, 1: 81.

Описан из Венгрии.

ЗП: Аз.-Куб. (юго-запад); **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВК:** Ман.-Самур. (окр. Махачкала); **ЗЗ:** Инг.-Рион. (север).

Указан для **СЗЗ** (Зернов, 2002: 62).

Центр. (юго-восток), Юго-Вост., Вост. (юго-запад) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

2. (697). *T. crinitum* (Schreb.) Nevski, 1934, Тр. Среднеаз. ун-та сер. 8в, 17: 38. — *Elymus crinitus* Schreb. 1777, Besch. Gräser, 2: 15. — *Hordeum crinitum* (Schreb.) Desf. 1798, Fl. Atl. 1: 113. — *Elymus intermedius* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 82. — *Taeniatherum caput-medusae* subsp. *crinitum* (Schreb.) Melderis, 1984, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 42, 1: 81.

Описан из Турции. Тур у s: «Смурна, W. Sherard» (OXF).

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Рион.-Квир. (восток); **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ;** **Т.**

Юго-Вост. (Балканский п-ов, Крым) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

21. (112). *Henrardia* C. E. Hubb.

1. (698). *H. persica* (Boiss.) C. E. Hubb. 1946, Blumea, Suppl. 3: 17. — *Lepturus persicus* Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. Nov., ser. 1, 13: 71. — *Pholiurus persicus* (Boiss.) A. Camus, 1922, Ann. Soc. Linn. Lyon, 69: 90. — *P. glabriglumis* Nevski, 1934, Тр. Среднеаз. ун-та сер. 8в, 17: 35, in clavi. — *Henrardia glabriglumis* (Nevski) Ovcz. 1957, Фл. Тадж. ССР, 1: 267. — *H. persica* subsp. *glabriglumis* (Nevski) Czopán. 1973, Опр. злаков Туркм.: 34.

Описан из Ирана. Тур у s: «In Persia Australi, Aucher, № 2914» (G).

ЮЗ: Ерев., Нах.; **Т.**

Юго-Зап., Ср. Азия.

Кроме более обычной разновидности с коротковолосистыми колосками — var. *persica*, нередко встречается разновидность var. *glaberrima* (Hausskn. ex Bornm.) C. E. Hubb. 1946, l. c.: 19 (= *Lepturus persicus* var. *glaberrimus* Hausskn. ex Bornm. 1905, Mitt. Thuring. Bot. Ver., N. F. 20: 51; = *Henrardia glabriglumis* (Nevski) Ovcz. 1957, l. c.: 267; = *H. persica* subsp. *glabriglumis* (Nevski) Czopán. 1973, l. c.: 34) с голыми колосками.

Tribus 3. *Bromeae* Dumort.

22. (113). *Ceratochloa* Beauv.

1. (699). *C. carinata* (Hook. et Arn.) Tutin, 1952, Clapham, Tutin et E. F. Warburg, Fl. Brit. Is.: 1458. — *Bromus carinatus* Hook. et Arn. 1840, Bot. Beech. Voy.: 403.

Описан из Калифорнии.

ЗЗ: Туап.-Адл.; **ВК:** Кубин.; **Т;** одичавший.

Сев. Амер.; культивируется и дичает в Атл., Центр., Вост. Европе.

2. (700). *C. cathartica* (Vahl) Herter, 1940, Rev. Südamer. Bot. 6: 144. — *Bromus catharticus* Vahl, 1791, Symb. Bot. 2: 22. — *B. uniolooides* Kunth, 1815, Humb., Bonpl.