

## 20. (111). *Taeniatherum* Nevski

1. (696). *T. asperum* (Simonk.) Nevski, 1934, Тр. Среднеаз. ун-та сер. 8в, 17: 38. — *Civiera caput-medusae* var. *aspera* Simonk. 1897, Term.-Tud. Közl. 29: 230. — *Taeniatherum caput-medusae* subsp. *asperum* (Simonk.) Melderis, 1984, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 42, 1: 81.

Описан из Венгрии.

**ЗП:** Аз.-Куб. (юго-запад); **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВК:** Ман.-Самур. (окр. Махачкала); **ЗЗ:** Инг.-Рион. (север).

Указан для **СЗЗ** (Зернов, 2002: 62).

Центр. (юго-восток), Юго-Вост., Вост. (юго-запад) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

2. (697). *T. crinitum* (Schreb.) Nevski, 1934, Тр. Среднеаз. ун-та сер. 8в, 17: 38. — *Elymus crinitus* Schreb. 1777, Besch. Gräser, 2: 15. — *Hordeum crinitum* (Schreb.) Desf. 1798, Fl. Atl. 1: 113. — *Elymus intermedius* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 82. — *Taeniatherum caput-medusae* subsp. *crinitum* (Schreb.) Melderis, 1984, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 42, 1: 81.

Описан из Турции. Тур у s: «Смурна, W. Sherard» (OXF).

**СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Рион.-Квир. (восток); **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ;** **Т.**

Юго-Вост. (Балканский п-ов, Крым) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

## 21. (112). *Henrardia* C. E. Hubb.

1. (698). *H. persica* (Boiss.) C. E. Hubb. 1946, Blumea, Suppl. 3: 17. — *Lepturus persicus* Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. Nov., ser. 1, 13: 71. — *Pholiurus persicus* (Boiss.) A. Camus, 1922, Ann. Soc. Linn. Lyon, 69: 90. — *P. glabriglumis* Nevski, 1934, Тр. Среднеаз. ун-та сер. 8в, 17: 35, in clavi. — *Henrardia glabriglumis* (Nevski) Ovcz. 1957, Фл. Тадж. ССР, 1: 267. — *H. persica* subsp. *glabriglumis* (Nevski) Czopán. 1973, Опр. злаков Туркм.: 34.

Описан из Ирана. Тур у s: «In Persia Australi, Aucher, № 2914» (G).

**ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т.**

Юго-Зап., Ср. Азия.

Кроме более обычной разновидности с коротковолосистыми колосками — var. *persica*, нередко встречается разновидность var. *glaberrima* (Hausskn. ex Bornm.) C. E. Hubb. 1946, l. c.: 19 (= *Lepturus persicus* var. *glaberrimus* Hausskn. ex Bornm. 1905, Mitt. Thuring. Bot. Ver., N. F. 20: 51; = *Henrardia glabriglumis* (Nevski) Ovcz. 1957, l. c.: 267; = *H. persica* subsp. *glabriglumis* (Nevski) Czopán. 1973, l. c.: 34) с голыми колосками.

### Tribus 3. *Bromeae* Dumort.

## 22. (113). *Ceratochloa* Beauv.

1. (699). *C. carinata* (Hook. et Arn.) Tutin, 1952, Clapham, Tutin et E. F. Warburg, Fl. Brit. Is.: 1458. — *Bromus carinatus* Hook. et Arn. 1840, Bot. Beech. Voy.: 403.

Описан из Калифорнии.

**ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ВК:** Кубин.; **Т;** одичавший.

Сев. Амер.; культивируется и дичает в Атл., Центр., Вост. Европе.

2. (700). *C. cathartica* (Vahl) Herter, 1940, Rev. Südamer. Bot. 6: 144. — *Bromus catharticus* Vahl, 1791, Symb. Bot. 2: 22. — *B. unioides* Kunth, 1815, Humb., Bonpl.

et Kunth, Nov. Gen. Sp.: 151. — *Ceratochloa haenkeana* C. Presl, 1830, Reliq. Haenk. 1: 285. — *C. uniolooides* auct. non (Willd.) Beauv.: Гроссг. 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1: 314.

Описан из Перу.

**ЗЗ:** Абх.; **ВЗ:** Ширв. (Апшеронский п-ов).

Южн. Америка; культивируется и дичает в Европе и Сев. Америке.

### 23. (114). *Bromus* L.

1. (701). *B. arvensis* L. 1753, Sp. Pl.: 77.

Описан из Европы.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг.; **Т:**

Европа; Сев., Ср. (заносный), Вост. Азия; Сев. Америка; заносится в другие страны.

2. (702). *B. racemosus* L. 1762, Sp. Pl., ed. 2: 114. — *B. popovii* Drob. 1925, Feddes Repert. 21: 40. — *B. tuzsonii* Pénzes, 1936, Bot. Közl. 33: 136.

Описан из Великобритании.

**ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах. (по Араксу); **Т:**

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

Кавказские и среднеазиатские популяции этого вида, описанные под названиями *B. popovii* и *B. tuzsonii*, по-видимому, не отличаются от западноевропейских.

3. (703). *B. commutatus* Schrad. 1806, Fl. Germ. 1: 353. — *B. racemosus* subsp. *commutatus* (Schrad.) Maire et Weiller, 1955, Maire, Fl. Afr. Nord. 3: 246.

Описан из Европы.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг., Ю. Караб.; **Т:**

Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

Редкая разновидность — var. *pubens* S. Wats. (1844, Phytom., 1: 1062): растения с коротковолосистыми (а не голыми) колосками, отмечена в **ВК** (Ман.-Самур.), **СЗЗ** и **ЗЗ** (Туап.-Адл.).

4. (704). *B. tzvelevii* S. G. Mussajev, 1976, Докл. АН АзербССР, 32, 9: 56.

Описан из Южного Закавказья. Турус: «Нахичеванская АССР, окр. сел. Нахирваз, на сухом травяном склоне, 19 VI 1973, С. Мусаев» (ВАК).

**ЮЗ:** Нах.

Эндемик.

5. (705). *B. secalinus* L. 1753, Sp. Pl.: 76.

Описан из Европы.

**ЗП** (юг); **ВП:** В. Ставр. (юго-зап.); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Тоб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв.

Европа; Сев., Юго-Зап. и Вост. Азия.

6. (706). *B. hordeaceus* L. 1753, Sp. Pl.: 77, s. str. — *B. secalinus* L. var. *hordeaceus* (L.) L. 1762, Sp. Pl., ed. 2: 112. — *B. thominii* Hard. 1833, Congr. Sci. Caen.: 56.

Описан из Швеции.

**Т.** (заносный).