

СЗЗ: Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх. (мыс Пицунда), Адж.; **ВЗ:** Ширв. (Апшеронский п-ов), Н. Кур. (юго-вост.); **Т:**

Атл. (юг), Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка; встречается как заносный в других внетропических странах.

26. (117). *Boissiera* Hochst. ex Steud.

1. (740). *B. squarrosa* (Soland.) Nevski, 1934, Тр. Среднеаз. ун-та, сер. 8в, 17: 30. — *Pappophorum squarrosum* Soland. 1794, in Russel, Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 244. — *P. pumilio* Trin. 1830, Мém. Acad. Sci. Pétersb., ser. 6, 1: 92. — *Boissiera bromoides* Hochst. ex Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 200, nom. illeg. — *B. pumilio* (Trin.) Hack. 1885, Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Naturw. (Wien), 50: 9. — *Bromus pumilio* (Trin.) P. M. Sm. 1969, Feddes Repert. 79, 6: 338. — *Euraphis squarrosa* (Soland.) Soják, 1982, Cas. Nár. Mus. Prag. 150: 140.

Описан из Сирии (окр. г. Халеб).

ЮЗ: Ерев., Нах.

Юго-Зап., Ср., Южн. Азия.

Более обычна разновидность — *Boissiera squarrosa* var. *glabriflora* (Boiss.) Bor (1967, Тахон, 16: 67; — *B. bromoides* var. *glabriflora* Boiss. 1884, Fl. Or. 5: 560) с голыми (а не коротковолосистыми) колосками.

Tribus 4. **Poeae**

27. (118). *Avena* L.

1. (741). *A. trichophylla* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 393. — *A. sterilis* subsp. *trichophylla* (C. Koch) Malz. 1930, Тр. прикл. бот. ген. сел., прил. 38: 379.

Описан из Азербайджана (Ширванская степь). Турус: «In der schirwan'schen Ebene auf Kalk, Mergelboden 500–700' hoch, C. Koch» (В?).

ВЗ: Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т:**

Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

2. (742). *A. persica* Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 230. — *A. ludoviciana* Durieu, 1855, Act. Soc. Linn. Bordeaux, 20: 41. — *A. sterilis* var. *ludoviciana* (Durieu) Gillet et Magne, 1873, Nouv. Fl., ed. 3: 532.

Описан из Ирана. Турус: «Persia, in montibus prope Dalaki, № 162, Th. Kotschy» (G).

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т:**

Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

3. (743). *A. sterilis* L. 1762, Sp. Pl., ed. 2: 118, s. str. — *A. macrocarpa* Moench, 1794, Meth. Pl.: 196.

Описан из Испании.

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх. (заносный в Сухуми).

Южн. и Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап. и Ср. Азия.

4. (744). *A. byzantina* C. Koch, 1948, Linnaea, 21: 392. — *A. sterilis* subsp. *byzantina* (C. Koch) Thell. 1911, Vierteljahr. Naturf. Ges. Zürich, 56: 316.

Описан из Турции. Турус: «In der Umgegend von Konstantinopol unter dem Getreide auf Mergel- und Kalkboden, C. Koch» (B).