

33: Адж. («Заносное в Батумском ботаническом саду, 21 VI 1974, А. Дмитриева»).

Атл., Центр., Южн. Европа; Средиз.; Сев. Африка.

31. (122). *Ventenata* Koel.

1. (761). *V. dubia* (Leers) Coss. 1855, in Durieu, Expl. Sci. Algerie, 2: 104. — *Avena dubia* Leers, 1775, Fl. Herborn.: 41.

Описан из Германии.

ЗП; ВП: В. Ставр.; ЗК; ЦК; ВК: Ассо-Арг., Ман.-Самур. (окр. Махачкалы); СЗЗ; ЗЗ: Туап.-Адл.; ЦЗ; ВЗ: Иорск.-Шек.; Т.

Центр., Южн., Вост. (юго-зап.) Европа; Юго-Зап. Азия.

32. (123). *Gaudinopsis* Eig

1. (762). *G. macra* (Stev. ex Bieb.) Eig, 1929, Feddes Repert. 26: 77. — *Avena macra* Stev. ex Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 77.

Описан из Грузии. Turus: «Ex Iberia, leg. Steven a. 1806» (LE!).

ВК: Ман.-Самур. (близ побережья), Кубин.; ЦЗ; ВЗ: Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; ЮЗ: Ерев., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Вост. (Греция, Крым) Европа; Юго-Зап., Ср. (юго-зап.) Азия.

33. (124). *Hierochloë* R. Br.

1. (763). *H. arctica* C. Presl, 1830, Reliq. Haenk. 1: 252. — *H. hirta* subsp. *arctica* (C. Presl) G. Weim. 1971, Bot. Not. (Lund), 124: 150. — *H. odorata* subsp. *arctica* (C. Presl) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 349. — *H. odorata* auct. non (L.) Beauv.: Гросср. 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1: 143, р. max. p.

Описан из Канады.

ЦК; ЗЗ: Инг.-Рион. (северо-восток), Адж.; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; ВЗ: Мург.-Муровд. (запад); ЮЗЗ: Джав.-В. Ах.; ЮЗ: Севан.

Сев., Центр., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (сев.-вост. Турция), Центр., Вост. (сев.) Азия; Сев. Америка.

2. (764). *H. stepporum* P. A. Smirn. 1958, Бюл. Моск. об-ва исп. прир., отд. биол. 63,5: 81. — *Anthoxanthum stepporum* (P. A. Smirn.) Veldkamp, 1985, Blumea, 30: 349. — *Hierochloë repens* auct. non (Host) Beauv.: Цвел. 1976, Злаки СССР: 352.

Описан из Восточной Европы.

ЗП; ВП: В. Ставр.

Вост. Европа; Сев. (запад) и Ср. Азия.

Предлагалось (Y. Schouten, Veldkamp, 1985, Blumea, 30: 319–351) присоединить *Hierochloë* к действительно очень близкому к нему роду *Anthoxanthum* L. На наш взгляд, несмотря на наличие в Юго-Вост. Азии переходных между указанными родами видов, этого делать не стоит, так как у видов приведенных родов разное основное число хромосом.

34. (125). *Anthoxanthum* L.

1. (765). *A. amarum* Brot. 1800, Phyt. Lusit. 1, 3: 4. — *A. odoratum* subsp. *amarum* (Brot.) K. Richt. 1890, Pl. Eur. 1: 30.

Описан из Португалии.

ЗЗ: Адж. (одичавший в Батумском ботаническом саду).
Атл. (юг) и Южн. Европа.

2. (766). **A. odoratum** L. 1753, Sp. Pl.: 28.

Описан из Европы.

СЗЗ; ЗЗ; Т.

Европа; Сев., Юго-Зап., Вост. (заносный) Азия; Сев. Америка (заносный).

3. (767). **A. alpinum** Á. et D. Löve, 1948. Rep. Depart. Agric. Univ. Reykjavik, ser. B, 3: 105. — *A. odoratum* subsp. *alpinum* (Á. et D. Löve) B. M. G. Jones et Melderis, 1964, Proc. Bot. Soc. Brit. Is. 5, 4: 376.

Описан из Швеции.

ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг., Ю. Караб. (сев.-зап.).

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Америка.

35. (126). Trisetum Pers.

Sect. 1. Rigida Chrtek

1. (768). **T. teberdense** (Litv.) Charadze, 1938, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси) 1: 14. — *T. rigidum* var. *teberdense* Litv. 1932, Список раст. Герб. фл. СССР, 11: 11. — *T. rigidum* var. *ciliatifolium* Roshev. 1934, Фл. СССР, 2: 256. — *T. rigidum* subsp. *teberdense* (Litv.) Tzvel. 1971, Новости сист. высш. раст. 7: 62.

Описан с Центрального Кавказа. Тур у s: «Сев. Кавказ, по лесистому склону к Теберде в средн. течении, 1300 м, 10 V11 1905, Herb Fl. Ross. № 2810, Д. Литвинов» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.
Эндемик.

2. (769). **T. rigidum** (Bieb.) Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg. 2: 662. — *Avena rigida* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 77. — *Arundo wilhelmsii* Ledeb. 1818, Mém. Acad. Sci. Pétersb. 6: 593, tab. 19.

Описан из Восточного Закавказья. Lectotypus (Tzvelev, 1976: 261): «Ex Caucaso Schirvaniensi altiore ca. Kurt-Bulak lecta» (LE!).

ЦК; ВК; ЗЗ: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Мехс., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ; Т.**

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев.-зап. Иран).

3. (770). **T. buschianum** Seregin, 1961, Бот. мат. (Ленинград) 21: 50. — *T. rigidum* var. *molle* Somm. et Levier, 1900, Тр. Петерб. бот. сада 16: 444.

Описан из Центрального Кавказа. Тур у s: «Кабардино-Балкарская АССР, верховье Безенгийского Черека по левому берегу Безенги, 10 V11 1958, Р. Середин» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.
Эндемик.