

ЗЗ: Адж. (одичавший в Батумском ботаническом саду).
Атл. (юг) и Южн. Европа.

2. (766). **A. odoratum** L. 1753, Sp. Pl.: 28.

Описан из Европы.

СЗЗ; ЗЗ; Т.

Европа; Сев., Юго-Зап., Вост. (заносный) Азия; Сев. Америка (заносный).

3. (767). **A. alpinum** Á. et D. Löve, 1948. Rep. Depart. Agric. Univ. Reykjavik, ser. B, 3: 105. — *A. odoratum* subsp. *alpinum* (Á. et D. Löve) B. M. G. Jones et Melderis, 1964, Proc. Bot. Soc. Brit. Is. 5, 4: 376.

Описан из Швеции.

ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг., Ю. Караб. (сев.-зап.).

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Америка.

35. (126). Trisetum Pers.

Sect. 1. Rigida Chrtek

1. (768). **T. teberdense** (Litv.) Charadze, 1938, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси) 1: 14. — *T. rigidum* var. *teberdense* Litv. 1932, Список раст. Герб. фл. СССР, 11: 11. — *T. rigidum* var. *ciliatifolium* Roshev. 1934, Фл. СССР, 2: 256. — *T. rigidum* subsp. *teberdense* (Litv.) Tzvel. 1971, Новости сист. высш. раст. 7: 62.

Описан с Центрального Кавказа. Тур у s: «Сев. Кавказ, по лесистому склону к Теберде в средн. течении, 1300 м, 10 V11 1905, Herb Fl. Ross. № 2810, Д. Литвинов» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.
Эндемик.

2. (769). **T. rigidum** (Bieb.) Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg. 2: 662. — *Avena rigida* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 77. — *Arundo wilhelmsii* Ledeb. 1818, Mém. Acad. Sci. Pétersb. 6: 593, tab. 19.

Описан из Восточного Закавказья. Lectotypus (Tzvelev, 1976: 261): «Ex Caucaso Schirvaniensi altiore ca. Kurt-Bulak lecta» (LE!).

ЦК; ВК; ЗЗ: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ; Т.**

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев.-зап. Иран).

3. (770). **T. buschianum** Seregin, 1961, Бот. мат. (Ленинград) 21: 50. — *T. rigidum* var. *molle* Somm. et Levier, 1900, Тр. Петерб. бот. сада 16: 444.

Описан из Центрального Кавказа. Тур у s: «Кабардино-Балкарская АССР, верховье Безенгийского Черека по левому берегу Безенги, 10 V11 1958, Р. Середин» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.
Эндемик.

4. (771). **T. transcaucasicum** Seregin, 1961, Бот. мат. (Ленинград) 21: 54. — *T. rigidum* var. *ovale* Somn. et Levier, 1900, Тр. Петерб. бот. сада, 16: 444. — *T. distichophyllum* auct. non (Vill.) Beauv.: Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 256.

Описан с Восточного Кавказа. Турус: «АзербСССР, Кубинский р-н, гора Туфандаг, сланцевые каменистые места, 3000–3200 м, 13 V 1935, И. Карягин» (LE!).

ВК; ВЗ: Алаз.-Агр.ч.

Эндемик.

Sect. 2. *Trisetum*

5. (772). **T. turcicum** Chrték, 1966, Bot. Not. (Lund), 119, 4: 487. — *T. sibiricum* auct. non Rupr.: Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 253, quoad pl. sauc.; Гроссг. 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1: 202.

Описан из Турции. Турус: «Vallea de Djimil (Lazistan), ca. 2000 m, V 11 1966, № 1551, В. Баланса» (PRC, isotypus — LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тeb., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Инг.-Рион. (сев.-вост.), Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агр.ч., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Ю. Караб.

Юго-Зап Азия (Турция).

6. (773). **T. flavescens** (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 88. — *Avena flavescens* L. 1753, Sp. Pl.: 80. — *Trisetum pratense* Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 97.

Описан из Европы.

ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Алаз.-Агр.ч., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Европа; Юго-Зап. и Ср. (юго-зап.) Азия.

7. (774). **T. parvispiculatum** (Tzvel.) Probst, 1975, Бот. журн. 60, 5: 674. — *T. flavescens* subsp. *parvispiculatum* Tzvel. 1970, Список раст. Герб. фл. СССР, 18: 6.

Описан из Дагестана. Турус: «Махачкалинский р-н, близ подножья сев. склона горы Таркитау, 17 V 1953, № 407, Я. Проханов» (LE!).

ВП: Тер.-Сулак.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК; ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **Т.**

Юго-Зап. (Иран) и Ср. (юго-зап.) Азия.

Sect. 3. *Trisetaera* (Aschers. et Graebn.) Honda

8. (775). **T. spicatum** (L.) K. Richt. 1890, Pl. Eur. 1: 59: Габриэлян, 2004, Фл., растит. и раст. рес. Арм. 15: 14. — *Aira spicata* L. 1753, Sp. Pl.: 64.

Описан из Швеции.

8а. **T. spicatum** (L.) K. Richt. subsp. *ovatipaniculatum* Hult. 1959, Svensk Bot. Tidskr. 53, 2: 208. — *T. ovatipaniculatum* (Hult.) Galushko, 1976, Новости сист. высш. раст. 13: 254.

Описан из Центральной Европы.

ЗК: Бело-Лаб. (верховья Лабь), Уруп-Тeb., В. Куб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЮЗ:** Севан.

Центр. и Южн. Европа.