

161. — *K. caucasica* (Domin) B. Fedtsch. 1915, Раст. Турк.: 129, quoad nom. — *K. gracilis* var. *buschiana* Domin, 1929, Докл. АН СССР, сер. А, 6: 141. — *K. buschiana* (Domin) Gontsch. 1934, Фл. СССР, 2: 328. — *K. eriostachya* auct. non Pancic: Dogan, 1985, in Fl. Turk. 9: 331.

Описан с Кавказа. Lectotypus (Tzvelev, 1976: 273): «Caucasus, in locis graminosis montium, 2700–2800 m, 8 VII 1829, C. Meyer» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион. (сев.-вост.), Адж.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т.**

Юго-Зап. Азия.

Очень полиморфный подвид, особенно варьирующий по степени опушенности всего растения. Различают следующие разновидности: *Koeleria albovii* subsp. *caucasica* var. *denudata* (Domin) Tzvel. (1976, Злаки СССР: 273) — всё растение голое или почти голое, кроме метелки; *K. albovii* subsp. *caucasica* var. *buschiana* (Domin) Tzvel. (1976, l. c.: 273) со стеблями, более чем на 2 см от основания метелки коротковолосистыми *K. albovii* subsp. *caucasica* var. *glabriculumis* (Domin) Tzvel. (1976, l. c.: 273) — всё растение голое, кроме метелок и колосков, которые у двух предыдущих разновидностей голые.

8. (786). **K. brevis** Stev. 1857, Bull. Soc. Nat. Moscou, 30, 3: 110.

Описан из Крыма. Lectotypus (Цвелев, 1976: 278): «Tauria, Sudak, 1832, leg. Steven» (LE!).

Указан для **Т** (Мусаев, 1979, Определ. злаков Азерб.: 91).

Центр. (Добруджа), Южн. (вост.), Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

39. (130). *Deschampsia* Beauv.

1. (787). **D. caespitosa** (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 91, 149, 160. — *Aira caespitosa* L. 1753, Sp. Pl.: 64. — *A. brevifolia* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 63, non *Deschampsia brevifolia* R. Br. 1824. — *Deschampsia biebersteiniana* Schult. 1824, Mant. 2: 380.

Описан из Европы.

1а. **D. caespitosa** (L.) Beauv. subsp. **caespitosa**.

ЗП: Аз-Куб.; **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв. (горы), Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ** (горы).

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср. и Центр. Азия; Сев. Америка.

1б. **D. caespitosa** (L.) Beauv. subsp. **wilhelmsii** (Steud.) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 284. — *Aira wilhelmsii* Steud. 1834, Syn. Pl. Glum. 1: 219.

Описан с Кавказа. Турус: «Caucasia, Wilhelms» (В).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Севан., Дар., Занг.; **Т.**

Юго-Зап. Азия.

2. (788). **D. media** (Gouan) Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg. 2: 687. — *Aira media* Gouan, 1773, Illustr.: 3.

Описан из Франции.

СЗЗ.

Южн. Европа.