

307. — *A. articulata* Desf. 1798, Fl. Atl. 1: 70. — *Corynephorus articulatus* (Desf.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 159. — *Anachortus articulatus* (Desf.) Jiras. et Chrtek, 1962, Preslia, 34: 383.

Описан из Франции.

ВЗ: Ширв., Н. Кур.; **Т:**

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

43. (134). *Holcus* L.

Sect. 1. *Holcus*

1. (794). *H. lanatus* L. 1753, Sp. Pl.: 1048.

Описан из Европы.

ЗК; ЦК; ВК: Ассо-Арг.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карт-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.

Европа; Юго-Зап. Азия.

Sect. 2. *Paraholcus* Tzvel.

2. (795). *H. annuus* Salzm. ex C. A. Mey. 1831, Verz. Pf. Cauc.: 17. — *H. setosus* Trin. 1840, Мém. Acad. Sci. Pétersb., ser. 6, 5(7), Sci. Nat. 3, Bot.: 17, nom. illeg.

Описан из Тальша. Тур у s: «In insula Sara, C. A. Meyer» (LE!).

Т:

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия.

44. (135). *Milium* L.

Sect. 1. *Milium*

1. (796). *M. effusum* L. 1753, Sp. Pl.: 61.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тeb., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:**

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

2. (797). *M. schmidtianum* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 438. — *M. caucasicum* Somm. et Levier, 1897, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n.s. 4: 209. — *M. effusum* subsp. *schmidtianum* (C. Koch) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 294.

Описан из Центрального Закавказья. Тур у s: «Von K. Schmidt aus Grusien erhalten» (В?).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тeb., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион. (горы), Адж.; **ЦЗ:** Карт-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.

Юго-Зап. Азия.

3. (798). *M. transcaucasicum* Tzvel. 1960, Бот. мат. (Ленинград), 20: 23.

Описан из Южного Закавказья. Тур у s: «Нахичеванская АССР, Шахбузский р-н, западнее перевала Биченах, 23 VI 1957, № 386, Н. Цвелев и С. Черепанов» (LE!).

ЮЗ: Дар., Нах., Занг.; **Т:**

Юго-Зап. Азия.