

307. — *A. articulata* Desf. 1798, Fl. Atl. 1: 70. — *Corynephorus articulatus* (Desf.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 159. — *Anachortus articulatus* (Desf.) Jiras. et Chrtek, 1962, Preslia, 34: 383.

Описан из Франции.

ВЗ: Ширв., Н. Кур.; **Т:**

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

43. (134). *Holcus* L.

Sect. 1. *Holcus*

1. (794). *H. lanatus* L. 1753, Sp. Pl.: 1048.

Описан из Европы.

ЗК; ЦК; ВК: Ассо-Арг.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карт-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.

Европа; Юго-Зап. Азия.

Sect. 2. *Paraholcus* Tzvel.

2. (795). *H. annuus* Salzm. ex C. A. Mey. 1831, Verz. Pf. Cauc.: 17. — *H. setosus* Trin. 1840, Мém. Acad. Sci. Pétersb., ser. 6, 5(7), Sci. Nat. 3, Bot.: 17, nom. illeg.

Описан из Тальша. Тур у s: «In insula Sara, C. A. Meyer» (LE!).

Т:

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия.

44. (135). *Milium* L.

Sect. 1. *Milium*

1. (796). *M. effusum* L. 1753, Sp. Pl.: 61.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тeb., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:**

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

2. (797). *M. schmidtianum* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 438. — *M. caucasicum* Somm. et Levier, 1897, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n.s. 4: 209. — *M. effusum* subsp. *schmidtianum* (C. Koch) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 294.

Описан из Центрального Закавказья. Тур у s: «Von K. Schmidt aus Grusien erhalten» (В?).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тeb., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион. (горы), Адж.; **ЦЗ:** Карт-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.

Юго-Зап. Азия.

3. (798). *M. transcaucasicum* Tzvel. 1960, Бот. мат. (Ленинград), 20: 23.

Описан из Южного Закавказья. Тур у s: «Нахичеванская АССР, Шахбузский р-н, западнее перевала Биченах, 23 VI 1957, № 386, Н. Цвелев и С. Черепанов» (LE!).

ЮЗ: Дар., Нах., Занг.; **Т:**

Юго-Зап. Азия.

Sect. 2. *Miliellum* Tzvel.

4. (799). *M. alexeenkoi* (Tzvel.) Tzvel. 1993, Бот. журн. 78, 10: 89. — *M. vernale* var. *alexeenkoi* Tzvel. 1976, Злаки СССР: 296. — *M. vernale* subsp. *alexeenkoi* (Tzvel.) Probat. 1977, Новости сист. высш. раст. 14: 7.

Описан из Азербайджана. Т у р у с: «Prov. Baku, distr. Geok-czai prope pag. Ivanovka, 2000', in silvis, 13 IV 1902, № 1438, Th. Alexeenko» (LE!).

ВК: Ман.-Самур. (окр. Дербента), Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур. (вост.); **Т:** Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

5. (800). *M. vernale* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 53.

Описан с Кавказа. Л е с т о т у р у с (Tzvelev, 1976: 296): «Cauc., leg. Steven» (LE!). **ЗП; ВП:** В. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

6. (801). *M. intermedium* (Probat.) Tzvel. 1993, Бот. журн. 78, 10: 89. — *M. vernale* subsp. *intermedium* Probat. 1977, Новости сист. высш. раст. 14: 9; Пробат. 1979, Новости сист. высш. раст. 16: 36.

Описан из Алжира.

СЗЗ; ЮЗ: Мегр.-Зан.

Центр., Южн. Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

Несмотря на незначительные морфологические различия, таксоны из родства *M. vernale* s.l. правильнее принимать за самостоятельные виды единого полиплоидного комплекса. Все они различаются по хромосомным числам: у *M. alexeenkoi* $2n = 14$, у *M. vernale* s. str. $2n = 10$ и у *M. intermedium* $2n = 18$, а также имеют разные ареалы. Очень близкий среднеазиатский вид *M. tzelevii* (Probat.) Tzvel. (= *M. vernale* subsp. *tzelevii* Probat. 1977, l. c.: 10) также имеет $2n = 18$.

45. (136). *Calamagrostis* Adans.

Sect. 1. *Deyeuxia* (Clar.) Dumort.

1. (802). *C. arundinacea* (L.) Roth, 1789, Tent. Fl. Germ. 2, 1: 89. — *Agrostis arundinacea* L. 1753, Sp. Pl.: 61. — *Deyeuxia arundinacea* (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 160.

Описан из Европы.

ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ: Пшад.-Джуб.; **ЗЗ** (горы); **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Севан., Дар., Занг., Ю. Караб.

Европа; Сев., Юго-Зап. Азия.

2. (803). *C. subchalybaea* Tzvel. 1965, Новости сист. высш. раст. 1965: 45. — *C. adylsuensis* Seregin, 1965, Переч. семян Бот. сада Пятигорск. фарм. ин-та: 23.

Описан с Центрального Кавказа. Т у р у с: «Терская губ., морены в дол. Донгузоруна, 25 VII 1911, Е. и Н. Буш» (LE).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.

Эндемик.

3. (804). *C. iberica* (Griseb.) Litv. 1921, Бот. мат. (Ленинград), 2: 117. — *C. sylvatica* var. *iberica* Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 426. — *C. caucasica* subsp. *iberica* (Griseb.) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 307.

Описан из Грузии. Т у р у с: «Iberia, Lumiskela, F. Hohenacker» (LE!).