

Описан из Франции.

**ВК:** Ман.-Самур. (юго-вост.), Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур. (юго-вост.); **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т:**

Атл., Центр. (юг), Южн., Вост. (юго-вост.) Европа; Сев. (юго-зап.), Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.

### 50. (141). *Gastridium* Beauv.

1. (840). **G. phleoides** (Nees et Meyen) C. E. Hubb. 1954, Kew Bull. 9: 375. — *Lachnagrostis phleoides* Nees et Meyen, 1843, Nova Acta Acad. Leop.-Carol. 19, Suppl. 1: 146. — *Gastridium ventricosum* subsp. *phleoides* (Nees et Meyen) Tzvel. 1966, Бот. журн. 51, 8: 1104.

Описан из Южной Америки (Чили).

**Т:**

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

2. (841). **G. ventricosum** (Gouan) Schinz et Thell. 1913, Vierteljahr. Naturf. Ges. Zürich, 58: 39. — *Agrostis ventricosa* Gouan, IV-VI 1762, Hort. Monsp.: 39. — *Milium lendigerum* L. X-XII 1762, Sp. Pl., ed. 2: 91. — *Gastridium lendigerum* (L.) Desv. 1818, Obs. Fl. Angers: 48.

Описан из Франции.

**ВК:** Кубин. (окр. Кубы); **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт. **Т:**

Атл., Центр. (юг), Южн. Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

### 51. (142). *Scolochloa* Link

1. (842). **S. festucacea** (Willd.) Link, 1827, Hort. Bot. Berol. 1: 137. — *Arundo festucacea* Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol. 1: 126.

Описан из Германии.

**ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (зап); **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев.

Сев. (юго-вост.), Центр., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (сев.-вост. Турция), Ср., Центр. (сев. Монголия) Азия; Сев. Америка.

### 52. (143). *Schedonorus* Beauv.

= *Festuca* subgen. *Schedonorus* (Beauv.) Peterm.

#### Sect. 1. *Plantynia* Dumort.

1. (843). **S. giganteus** (L.) Soreng et Terrell, 1997, Phytologia, 83, 2: 86; Holub, 1998, Preslia, 70, 1: 113; Цвел., 1998, Новости сист. высш. раст. 31: 259. — *Bromus giganteus* L. 1753, Sp. Pl.: 77. — *Festuca gigantea* (L.) Vill. 1787, Hist. Pl. Dauph. 2: 110; Креч. и Бобр. 1934, во Фл. СССР, 2: 534; Цвел., 1976, Злаки СССР: 394. — *Lolium giganteum* (L.) Darbysh. 1993, Novon, 3, 3: 241.

Описан из Европы.

**ЗП:** Аз.-Куб. (по Кубани), З. Ставр. (окр. Ставрополя); **ВП:** В. Ставр. (по Каме); **ЗК;** **ЦК;** **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т:**

Европа; Сев.(юг), Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.

## Sect. 2. Schedonorus

2. (844). **S. pratensis** (Huds.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 99; Soreng a. Terrell, 1997, Phytologia, 83, 2: 86; Цвел., 1998, Новости сист. высш. раст. 31: 259. — *Festuca pratensis* Huds. 1762, Fl. Angl. : 37. — *F. elatior* L. 1753, Sp. Pl.: 75, nom. ambig. — *Lolium pratense* (Huds.) Darbysh. 1993, Novon, 3, 3: 242.

Описан из Великобритании.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (заносный).  
Гибризирует с видами рода *Lolium*; о гибридах см. после рода *Lolium*.

3. (845). **S. arundinaceus** (Schreb.) Dumort. 1824, Observ. Gram. Belg.: 106, nom. conserv.; Soreng a. Terrell, 1997, Phytologia, 83, 2: 86. — *F. arundinacea* Schreb. 1771, Spicil. Fl. Lips.: 57, Креч., Бобр. 1934, во Фл. СССР, 2: 531; Цвел., 1976, Злаки СССР, 395. — *F. elatior* L. 1753, Sp. Pl.: 75, nom. ambig. — *Poa phoenix* Scop. 1771, Fl. Carniol., ed. 2, 1: 74. — *Bromus litoreus* Retz. 1779, Fl. Scand. Prodr.: 19. — *Schedonorus elatior* (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 99. — *Festuca litorea* (Retz.) Wahlenb. 1821, Nova Acta Upsal. 8: 211. — *Lolium arundinaceum* (Schreb.) Darbysh. 1993, Novon, 3, 3: 242. — *Schedonorus phoenix* (Scop.) Holub, 1998, Preslia, 70,1: 113. — *S. litoreus* (Retz.) Tzvel. 1998, Новости сист. высш. раст. 31: 258.

Описан из Германии (окр. Лейпцига).

3а. **S. arundinaceus** subsp. **arundinaceus**.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Европа; Сев. (юго-запад), Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.

Разновидность **Schedonorus arundinaceus** var. **aristatus** (Regel) Tzvel. comb. nova (= *Festuca arundinacea* var. *aristata* Regel, 1881, Тр. Петерб. бот. сада, 7, 2: 596) с короткими (0.7–3 мм дл.) остями на нижних цветковых чешуях известна под названиями: *F. elatior* subsp. *arundinacea* var. *orientalis* Hack. (1882, Monogr. Fest.: 154), *F. orientalis* (Hack.) V. Krecz. et Bobr. (1934, во Фл. СССР, 2: 531, non В. Fedtsch. 1915) и *F. arundinacea* subsp. *orientalis* (Hack.) Tzvel. (1970, Список раст. Герб. фл. СССР, 18: 17).

3б. **Schedonorus arundinacea** Schreb. subsp. **fenas** (Lag.) Tzvel. comb. nova. — *Festuca fenas* Lag. 1816, Gen. et Sp. Pl.: 4. — *F. elatior* subsp. *arundinacea* (Schreb.) Hack. var. *fenas* (Lag.) Hack. 1882, Monogr. Fest.: 156. — *F. arundinacea* subsp. *fenas* (Lag.) Arcang. 1894, Compend. Fl. Ital. ed. 2: 61; Цвел., 1976, Злаки СССР: 395. — *F. arundinacea* subsp. *interrupta* (Desf.) Tzvel. 1971, Бот. журн. 56, 9: 1253, quoad pl.

Описан из Испании.

**ЗП** (Таманский п-ов); **ВК**: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ**: Ширв., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ**: Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

О гибриде *S. arundinacea* s. l. x *Lolium perenne* см. комментарии к роду *Lolium*.

## 53. (144). *Lolium* L.

1. (846). **L. perenne** L. 1753, Sp. Pl.: 83. — *L. marschallii* Stev. 1857, Bull. Soc. Nat. Moscou, 30, 3: 103.

Описан из Европы.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.