

34. (889). **F. beckeri** (Hack.) Trautv. 1884, Тр. Петерб. бот. сада, 9, 1: 325. — *F. ovina* subsp. *beckeri* Hack. 1882, Monogr. Fest.: 100.

Описан с Поволжья (окр. Волгограда). Турус: «Ad Wolgam inferiorem pr. Sarepta, Becker» (W, isotypus — LE!).

ВП: В. Ставро.; **СЗЗ:** Анап.-Гел. (приморские пески).

Вост. Европа (юг); Сев., Юго-Зап. (побережье Босфора), Ср. (сев.) Азия.

35. (890). **F. ovina** L. 1753, Sp. Pl.: 73.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК:** Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.

Сев., Центр., Вост. Европа; Сев., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

36. (891). **F. ruprechtii** (Boiss.) V. Krecz. et Bobr. 1934, Фл. СССР, 2: 769, 507. — *F. ovina* subsp. *laevis* var. *ruprechtii* Boiss. 1884, Fl. Or. 5: 619. — *F. ovina* subsp. *ruprechtii* (Boiss.) Tzvel. 1971, Бот. журн. 56, 9: 1255. — *F. supina* auct. non Schur: Креч. и Бобр. 1934, Фл. СССР, 2: 504. — *F. ovina* auct. non L.: Е. Алексеев, 1980, Овсяницы Кавк.: 97, р. max. р. — *F. airoides* auct. non Lam.: Markgr.-Dann. 1985, in P. H. Davis, Fl. Turk. 9: 437, р. р.

Описан с Восточного Кавказа. Lectotypus (Tzvelev, hoc loco): «Tuschetia, pr. Diklo, in m. Kawlari, 1570', 2 VIII 1861, Ruprecht» (G, isotypus — LE!).

ЗК; **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион. (север), Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Севан.

Вост. Европа (Урал); Юго-Зап. Азия.

37. (892). **F. airoides** Lam. 1799, Encycl. Meth. Bot. 2: 464; Цвел., 1993, Бот. журн. 78, 10: 91. — *F. supina* Schur, 1866, Enum. Pl. Transs.: 784. — *F. ovina* var. *supina* (Schur) Hack. 1882, Monogr. Fest.: 88. — *F. ovina* subsp. *supina* (Schur) Schinz et R. Keller, 1905, Fl. Schweiz, ed. 2, Krit. Fl.: 26.

Описан из Франции.

ЗЗ: Адж.

Центр., Южн. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

38. (893). **F. filiformis** Pourr. 1788, Hist. et Mem. Acad. Roy. Sci. Inscr. et Belles-Lettres Toulouse, 3: 319; Цвел., 1993, Бот. журн. 78, 10: 91. — *F. capillata* Lam. 1778, Fl. Fr. 3: 597, nom. illeg. — *F. tenuifolia* Sibth. 1794, Fl. Oxon.: 44. — *F. ovina* subsp. *tenuifolia* (Sibth.) Čelak. 1867, Prodr. Fl. Bohm.: 50.

Описан из Франции.

ЗК: Уруп-Теб. (верховья Урупа).

Европа; Сев. Америка.

56. (147). **Bellardiochloa** Chiov.

1. (894). **V. polychroa** (Trautv.) Roshev. 1934, Фл. СССР, 2: 426. — *Festuca polychroa* Trautv. 1873, Тр. Петерб. бот. сада, 2: 485. — *Poa polychroa* (Trautv.) Grossh. 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1: 267.

Описан из Турции. Турус: «Armenia, in monte Ararat majore, ad lacum Kup-gol, 8 VIII 1871, G. Radde» (LE!).

ЗЗ: Адж.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (вост.), Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев. (сев.), Севан., Дар., Занг., Ю. Караб.
Юго-Зап. Азия.

57. (148). *Vulpia* C. C. Gmel.

Sect. 1. *Monachne* Dumort.

1. (895). *V. fasciculata* (Forssk.) Fritsch, 1909, Excursionsfl. Osterr., ed. 2: 74, 692. — *Festuca fasciculata* Forssk. 1775, Fl. Aeg.-Arab.: 22. — *F. uniglumis* Soland. 1789, in Aiton, Hort. Kew.: 108. — *Vulpia uniglumis* (Soland.) Dumort. 1823, Obs. Gram. Fl. Belg.: 101. — *V. membranacea* auct. non (L.) Dumort.: Цвел. 1976, Злаки СССР: 425.

Описан из Египта: «Alexandriae».

ЗЗ: Абх. (у устья р. Джакоба).

Атл., Центр., Южн. Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

Sect. 2. *Vulpia*

2. (896). *V. bromoides* (L.) S. F. Gray, 1821, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 124. — *Festuca bromoides* L. 1753, Sp. Pl.: 75. — *Bromus dertonensis* All. 1785, Fl. Pedem. 2: 249. — *Vulpia dertonensis* (All.) Gola, 1904, Malpighia, 18: 366.

Описан из Египта.

ЗЗ: близ побережья; **Т.**

Атл., Центр., Южн. Европа; Сев. Африка.

3. (897). *V. myuros* (L.) C. C. Gmel. 1806, Fl. Bad. 1: 8. — *Festuca myuros* L. 1753, Sp. Pl.: 74.

Описан из Европы.

ВП: Тер.-Сулак. (юг); **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗ;** **Т.**

Атл., Центр., Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев., Центр. Африка.

4. (898). *V. ciliata* Dumort. 1823, Obs. Gram. Belg.: 100. — *Festuca ciliata* Danth. ex Lam. et DC. 1805, Fl. Fr., ed. 3, 3: 55, non Gouan, 1762, nec Link, 1799.

Описан с Балканского п-ова.

ВП: Тер.-Сулак. (юго-вост.); **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Абх. (мыс Пицунда); **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Атл., Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

5. (899). *V. persica* (Boiss. et Buhse) V. Krecz. et Bobr. 1934, Фл. СССР, 2: 535. — *Nardurus persicus* Boiss. et Buhse, 1860, Мém. Soc. Nat. Moscou, 18: 225.

Описан из Ирана. Turus: «Persia orientalis, ad Bunegu inter Djendack et Jezd, 6 VIII 1849, leg. Buhse» (G, isotypus — LE!).

ВЗ: Ширв. (Апшеронский п-ов); **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Зап., Ср. Азия.

6. (900). *V. hirtiglumis* Boiss. et Hausskn. 1884, in Boiss. Fl. Or. 5: 629. — *V. villosa* T. Massl. 1957, Фл. ТаджССР, 1: 105.