

Описан из Ирака. Турus: «In vineis Mesopotamiae prope Orfa, leg. Haussknecht» (G).

ЮЗ: Ерев., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.  
Юго-Зап., Ср. Азия.

### 58. (149). *Nardurus* Reichenb.

1. (901). *N. maritimus* (L.) Murb. 1900, Contr. Fl. Nord-Ouest Afr. 4: 25. — *Festuca maritima* L. 1753, Sp. Pl.: 75. — ? *Triticum unilaterale* L. 1767, Mantissa: 35. — *T. hispanicum* Reichard, 1779, Syst. Pl. 1: 240. — *Festuca tenuiflora* Schrad. 1806, Fl. Germ. 1: 345. — *Nardurus tenuiflorus* (Schrad.) Boiss. 1842, Voy. Bot. Esp. 2: 667. — *Festuca krausei* Regel, 1881, Тр. Петерб. бот. сада, 7, 2: 594. — *Nardurus woronowii* Schischk. 1922, Bull. Mus. Géorg. 1: 3. — *N. krausei* (Regel) V. Krecz. et Bobr. 1934, Фл. СССР, 2: 540. — *Vulpia unilateralis* (L.) Stace, 1978, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 76, 4: 350. — *V. hispanica* (Reichard) Kerguélen, 1979, in Jovet et de Valmorin, Fl. Fr. (Coste) Suppl. 5: 545.

Описан из Испании.

ВК: Ман.-Самур. (юго-вост.), Кубин.; ВЗ: Ширв., Н. Кур., Караб.; ЮЗ: Ерев., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Атл., Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

Кроме разновидности var. *maritimus* с голыми колосками встречается var. *villosus* (Maire) Tzvel. 1973, Новости сист. высш. раст. 10: 87 (= *N. maritimus* subvar. *villosus* Maire, 1935, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 26: 234) с коротко, но густо волосистыми колосками. В восточной части ареала популяции этого вида имеют остистые нижние цветковые чешуи, что соответствует его типу, так как при первоописании *Festuca maritima* приведены слова «aristis capillaribus». Точное название отсутствующего в нашем регионе подвида, включающего растения с безостыми колосками, нам неизвестно.

### 59. (150). *Lolium* V. Krecz. et Bobr.

1. (902). *L. subulatum* (Banks et Soland.) Eig, 1937, Journ. Bot. (London), 75: 189. — *Triticum subulatum* Banks et Soland. 1794, in Russell, Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 244. — *Nardurus orientalis* Boiss. 1846, Diagn. Pl. Or. Nov., ser. 1, 7: 127. — *Lolium orientale* (Boiss.) V. Krecz. et Bobr. 1934, Фл. СССР, 2: 544. — *Nardurus subulatus* (Banks et Soland.) Bor, 1965, Danske Vid. Selsk. Biol. Skrift. 14, 4: 67.

Описан из Сирии («Aleppo»).

ВЗ: Ширв., Н. Кур.; ЮЗ: Ерев., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.  
Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

### 60. (151). *Scleropoa* Griseb.

1. (903). *S. rigida* (L.) Griseb. 1846, Spicil. Fl. Rumel. 2: 431. — *Poa rigida* L. 1755, Cent. Pl. 1: 5. — *P. pulchella* Stev. ex Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 417. — *Catapodium rigidum* (L.) F. T. Hubb. ex Dony, 1953, Fl. Bedfordshire: 437.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб. (Таманский п-ов); ВК: Ман.-Самур., Кубин.; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; ЮЗ: Ерев., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; Т.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.; заносный в других странах.

Кроме разновидности var. *rigida* с очень слабо разветвленными в одной плоскости метелками, встречается *Scleropoa rigida* (L.) Griseb. var. *major* (C. Presl) Tzvel. comb. nov. = *Sclerochloa rigida*