

Beauv. var. *major* C. Presl, 1826, Fl. Sic.: 45; = *Sclerochloa patens* C. Presl, 1820, Сур. Gram. Sic.: 45) с более широкими и разветвленными в трех плоскостях метелками. *Poa pulchella* описан по вполне типичным, но мелким экземплярам этого вида из Крыма.

61. (152). *Cutandia* Willk.

1. (904). *C. rigescens* (Grossh.) Tzvel. 1957, Бот. мат. (Ленинград) 18: 27. — *Scleropoa rigescens* Grossh. 1919, Вестн. Тифл. бот. сада, 13–14: 38. — *Festuca rigescens* Trin. ex Trautv. 1884, Тр. Петерб. бот. сада, 9, 1: 401, non Kunth, 1833. — *Desmazeria rigescens* (Grossh.) Ovcz. 1957, Фл. ТаджССР, 1: 194, comb. invalid. — *Catapodium rigescens* (Grossh.) Bor, 1970, in Rech. f. Fl. Iran. 70: 52.

Описан из Талыша. Тур у s: «In arena maritima prope Lenkoran, V 1838, leg. Hohenacker» (LE!).

ВЗ: Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (Иран).

2. (905). *C. dichotoma* (Forssk.) Trab. 1895, in Batt. et Trabut, Fl. Alger: 237. — *Festuca dichotoma* Forssk. 1775, Fl. Aeg.-Arab.: 22. — *Scleropoa dichotoma* (Forssk.) Parl. 1848, Fl. Ital. 1: 471.

Описан из Египта.

ВЗ: Ширв. (Апшеронский п-ов).

Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

3. (906). *C. memphitica* (Spreng.) Benth. 1881, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 19: 118. — *Dactylis memphitica* Spreng. 1801, Nachr. Bot. Gart. Halle, 1: 20. — *Scleropoa caspica* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 409.

Описан из Египта: «Alexandriae».

ВК: Ман.-Самур. (юго-вост.), Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур. (близ побережья); **Т:**

Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

62. (153). *Sphenopus* Trin.

1. (907). *S. divaricatus* (Gouan) Reichenb. 1830, Fl. Germ. Excurs.: 45. — *Poa divaricata* Gouan, 1773, Obs. Bot.: 4, tab. 2, fig. 1. — *Nephelochloa breviglumis* Trautv. 1881, Тр. Петерб. бот. сада, 7, 2: 523.

Описан из Франции.

ВК: Ман.-Самур. (юго-вост.), Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.

Южн. Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

63. (154). *Psilurus* Trin.

1. (908). *P. incurvus* (Gouan) Schinz et Thell. 1913, Vierteljahr. Naturf. Ges. Zürich, 58: 40; А. Зернов, 1998, Бюл. Моск. об-ва исп. прир., отд. биол. 103, 6: 58; Габриэлян, 2004, Фл., растит. и раст. рес. Арм. 15: 13. — *Nardus incurvus* Gouan, 1762, Hort. Monsp.: 33. — *N. aristatus* L. 1762, Sp. Pl., ed. 2, 1: 78. — *Psilurus aristatus* (L.) Trev. 1842, Fl. Eugap.: 39.

Описан из Франции.

СЗЗ; ЗЗ: Туап.-Адл.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.