

4. (944). **E. songarica** (Schrenk) Roshev. 1934, Фл. СССР, 2: 431. — *Glyceria songarica* Schrenk, 1841, Enum. Pl. Nov. 1: 1. — *Eremopoa altaica* subsp. *songarica* (Schrenk) Tzvel. 1966, Бот. журн. 51, 8: 1104.

Описан из Казахстана.

ВК: Кубин.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т** (Зувант).

Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.

66. (157). *Catabrosella* (Tzvel.) Tzvel.

Sect. 1. *Nevskia* (Tzvel.) Tzvel.

1. (945). **C. araratica** (Lipsky) Tzvel. 1966, Новости сист. высш. раст. 1966: 32. — *Catabrosa araratica* Lipsky, 1894, Тр. Петерб. бот. сада, 13, 2: 358. — *Colpodium araraticum* (Lipsky) Woronow, 1909, Фомин, Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 1, 4-5: 126.

Описан из Турции (гора Арарат). Тур у s: «На сев. склоне горы Большой Арарат, 8 VII 1893, В. Липский» (LE!).

ВЗ: Караб. (зап.); **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

Sect. 2. *Catabrosella*

2. (946). **C. fibrosa** (Trautv.) Tzvel. 1966, Новости сист. высш. раст. 1966: 32. — *Colpodium fibrosum* Trautv. 1873, Тр. Петерб. бот. сада, 2, 2: 486.

Описан из Турции (гора Арарат). Тур у s: «Armenia. in monte Ararat majore ad lacum Kürgül, leg. Radde» (LE!).

ВЗ: Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Занг., Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

3. (947). **C. variegata** (Boiss.) Tzvel. 1966, Новости сист. высш. раст. 1966: 32. *Catabrosa variegata* Boiss. 1844, Diagn. Pl. Or. ser. 1, 5: 71. — *Poa catabrosodes* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 406. — *Colpodium variegatum* (Boiss.) Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 384, in adnot. — *Catabrosa balansae* Boiss. 1884, Fl. Or. 5: 577. — *Colpodium balansae* (Boiss.) Woronow, 1909, Фомин, Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 1, 4-5: 126. — *C. chrysanthum* Woronow, 1933, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 1: 213.

Описан из Турции. Тур у s: «In humidiusculis regionis alpinae Olympi Bithyni, VII 1842, Boissier» (G, isotypus — LE!).

3а. **C. variegata** (Boiss.) Tzvel. subsp. **variegata**.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тeb., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион. (горы), Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев. (сев.), Севан., Дар., Занг., Ю. Караб. (зап.).

Юго-Зап. Азия.

3б. **C. variegata** (Boiss.) Tzvel. subsp. **leiantha** (Hack.) Tzvel. 1966, Новости сист. высш. раст. 1966: 32. — *Colpodium leianthum* Hack. 1913, Изв. Кавк. муз. 7: 203. — *C.*

variegatum var. *leianthum* (Hack.) Grossh. 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1: 270. — *Catabrosella variegata* var. *leiantha* (Hack.) E. Alexeev ex R. R. Mill, 1985, Fl. Turk. 9: 496.

Описан из Западного Закавказья (Сванетия). Турус: «Svanetia superior, ad pedem glaciei Gul montis Uzba, 2800 m, 21 VII 1911, A. Shelkovnikov» (W).

ЗК: Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

4. (948). **C. humilis** (Bieb.) Tzvel. 1965, Бот. журн. 50, 9: 1320. — *Aira humilis* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 57. — *Colpodium humile* (Bieb.) Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 384. — *Aira pumila* Stev. ex G. Westb. 1905, Тр. Бот. сада Юрьев. ун-та, 5: 153. — *Deschampsia pumila* (Stev. ex G. Westb.) Fomin et Woronow, 1908, Определ. раст. Кавк. и Крыма, 1, 2–3: 94.

Описан из Центрального Кавказа. Lectotypus (Tzvelev, 1976: 483, «typus»): «In monte Beschtou Caucasi» (LE!).

ЗП: 3. Ставр.; **ВП:** **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак. (сев.), Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** **ВЗ:** **ЮЗЗ:** Мех.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т** (Зувант).

Вост. Европа (юго-вост.); Сев. (юго-зап.), Юго-Зап., Ср. Азия.

5. (949). **C. parviflora** (Boiss. et Buhse) Tzvel. ex Czopan. 1973, Определ. злак. Туркм.: 77. — *Colpodium parviflorum* Boiss. et Buhse, 1859, in Boiss. Diagn. Pl. Or., ser. 2, 4: 133. — *Catabrosella humilis* subsp. *parviflora* (Boiss. et Buhse) Tzvel. 1966, Новости сист. высш. раст. 1966: 32.

Описан из Ирана. Турус: «In Persia monte Sahend, 1847, Buhse» (G, isotypus — LE!).

5а. **C. parviflora** (Boiss. et Buhse) Tzvel. ex Czopan. subsp. **parviflora**.

ВК: Ман.-Самур.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан. Юго-Зап., Ср. Азия.

5б. **C. parviflora** (Boiss. et Buhse) Tzvel. ex Czopan. subsp. **calvertii** (Boiss.) E. Alexeev ex R. R. Mill, 1985, Fl. Turk. 9: 496. — *Colpodium calvertii* Boiss. 1859, Diagn. Pl. Or., ser. 2, 4: 133. — *C. woronowii* Hack. 1914, Вестн. Тифл. бот. сада, 32: 8. — *Catabrosella humilis* subsp. *calvertii* (Boiss.) Tzvel. 1966, Новости сист. высш. раст. 1966: 32.

Описан из северо-восточной Турции. Турус: «Prope Erzeroum, Calvert» (G).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ.**

Юго-Зап. Азия.

67. (158). **Нялопоа** (Tzvel.) Tzvel.

1. (950). **H. lakia** (Woronow) Tzvel. 1966, Новости сист. высш. раст. 1966: 32. — *Colpodium lakium* Woronow, 1933, Тр. Бот. ин-та АН СССР, сер. 1, 1: 214.

Описан из Восточного Кавказа. Турус: «Дагестан, Лакский округ, р. Ненкурачай выше впадения ее в Казы-Кумухское Койсу, сырая лужайка, 8 IX 1927, А. Порецкий» (LE! cum isotypus).

ВК: В. Сулак. (басс. Казы-Кумухского Койсу).

Эндемик.