

2. (951). **H. czirahica** Gussejnov, 1988, Бот. журн. 73, 12: 1743.

Описан из Восточного Кавказа. Турус: «Дагестанская АССР, Агульский р-н, 13 км северо-западнее сел. Чирах, местечко Гунддав, влажные луга на сланцевых обнажениях, 2000–2200 м н. у. м., 25 VI 1975, Ш. Гусейнов» (LE!).

ВК: Ман.-Самур. (юг).

Эндемик.

3. (952). **H. pontica** (Bal.) Tzvel. 1965, Бот. журн. 50, 9: 1320. — *Catabrosa pontica* Bal. 1874, Bull. Soc. Bot. Fr. 21: 15. — *Poa capillipes* Somn. et Levier, 1893, Тр. Петерб. бот. сада, 13, 1: 52. — *Colpodium ponticum* (Bal.) Woronow, 1909, Фомин, Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 1: 126.

Описан из Турции. Турус: «Vallee de Djimil. 2800 m, Balansa» (G).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., (юг); **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион. (сев.)

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

68. (159). *Catabrosa* Beauv.

1. (953). **C. pseudairoides** (Herrm.) Tzvel. 1965, Бот. журн. 50, 11: 1633; Габриэлян, 2004, Фл., растит. и раст. рес. Арм. 15: 14. — *Poa pseudairoides* Herrm. 1812, Mém. Soc. Nat. Moscou, 3: tab. 13. — *Poa airoides* Herrm. 1812, l. c.: 232, non Koel. 1802. — *Catabrosa aquatica* subsp. *pseudairoides* (Herrm.) Tzvel. 1968, Новости сист. высш. раст. 1968: 29.

Описан из дельты Волги. Турус: «Circum Astrachan in pratis humidis, leg. Blume» (LE!).

ВП: Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Н. Кур. (юго-вост.); **ЮЗ:** Занг.; **Т:**

Вост. Европа (юго-вост.); Юго-Зап. (сев. Иран), Ср. (п-ов Мангышлак) Азия.

2. (954). **C. aquatica** (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.:97. — *Aira aquatica* L. 1753, Sp. Pl.: 64.

Описан из Европы.

ЗП; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т:**

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Америка.

Высокогорные популяции этого вида с более густыми метелками и буроватыми колосками принадлежат *Catabrosa aquatica* (L.) Beauv. var. *atrata* Tzvel., var. nova (= *C. aquatica* f. *atrata* Charadze, 1941, Фл. Груз. 1: 267, descr. georg.): paniculae densiores, spiculae brunnescentes, vulgo majores. Турус: «Armenia, ripa lac. Sevan, pag. Gjunej, 9 VIII 1986, G. Menitsky, T. Popova» (LE).

69. (160). *Paracolpodium* (Tzvel.) Tzvel.

1. (955). **P. colchicum** (Albov) Tzvel. 1966, Новости сист. высш. раст. 1966: 33. — *Catabrosa colchica* Albov, 1895, Тр. Тифл. бот. сада, 1, Прил. 1: 259. — *C. caucasica* Albov, 1895, l. c.: 259. — *Colpodium colchicum* (Albov) Woronow, 1909, Фомин, Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 1: 125. — *C. caucasicum* (Albov) Woronow, 1909, l. c.: 125.

Описан из Западного Кавказа. Турус: «In Circassia: in monte Adzituko, ad nives deliquescentes, 2285–2440 m, № 101, N. Albov» (G, isotypus — LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион. (горы), Адж.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).