

72. (163). *Puccinellia* Parl.

Sect. 1. *Xeratropis* (V. Krecz.) Bor

1. (961). *P. poecilantha* (C. Koch) Grossh. 1949, Определ. раст. Кавк.: 706. — *Festuca poecilantha* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 411. — *Atropis poecilantha* (C. Koch) V. Krecz. 1934, Фл. СССР, 2: 472. — *Puccinellia festuciformis* auct. non (Host) Parl.

Описан из Восточного Закавказья. Турис: «Arscheron, C. Koch» (В).

ВП: Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.

Вост. Европа (юго-вост.); Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

2. (962). *P. gigantea* (Grossh.) Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1: 486. — *Atropis gigantea* Grossh. 1919, Вестн. Тифл. бот. сада, 46–47: 35. — *A. sclerodes* V. Krecz. 1934, Фл. СССР, 2: 488, 766. — *Puccinellia brachylepis* Klok. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 12: 45. — *Atropis convoluta* auct. non (Hornem.) Griseb.: Гроссг. 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1: 280, р. р. — *Puccinellia limosa* auct. non (Schur) Holmb.: Цвел. 1976, Злаки СССР: 501, р. min. р. (quoad pl. cauc.). — *P. convoluta* auct. non (Hornem.) Grossh.: Зернов, 2002, Опр. сосуд. раст. сев.-зап. Причерн.: 57.

Описан из Талыша. Турис: «Prov. Baku, distr. Lenkoran, Kumbashi, in pratis, 17. 05. 1916, A. Grossheim» (LE!).

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Адж.; **ВЗ; ЮЗ; Т.**

Вост. Европа (юг); Сев. (юго-зап.), Юго-Зап., Ср. Азия.

Возможно, что этот вид стоит разделить на два самостоятельных вида: *P. sclerodes* V. Krecz. (Предкавказье, описан из Целиноградской области Казахстана) и *P. gigantea* s. str. (Закавказье), как считает В. Я. Нагалецкий, главным образом на основании анатомического строения листьев. Однако эти таксоны разграничить очень трудно.

3. (963). *P. bulbosa* (Grossh.) Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1: 36. — *Atropis bulbosa* Grossh. 1919, Вестн. Тифл. бот. сада, 46–47: 36. — *Puccinellia gigantea* subsp. *bulbosa* (Grossh.) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 502.

Описан из Центрального Закавказья. Турис: «Tiflis, mons Machata, 23. 05. 1910, D. Sosnovsky» (TGM, isotypus — LE!).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ; ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев.

Юго-Зап. Азия.

4. (964). *P. bilykiana* Klok. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 12: 46.

Описан с вост. Украины (Харьковская обл.).

ЗП.

Вост. Европа.

5. (965). *P. dolicholepis* V. Krecz. 1934, Фл. СССР, 2: 764, 488, nom. altern. — *Atropis dolicholepis* V. Krecz. 1934, l. c.: 488, 764.

Описан из Казахстана.

ВП; ВЗ: Ширв. (сев.-зап.), Иорск.-Шек. (вост.).

Вост. Европа (юго-вост.); Сев. (юго-зап.), Ср. Азия.

6. (966). *P. fominii* Bilyk, 1937, Збірн. праць пам. акад. Фомина: 218. — *P. dolicholepis* subsp. *fominii* (Bilyk) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 503.

Описан из Крыма. Тур у s: «Арабатская стрелка, близ Геническа, на солончаке у Сиваша, 9 IX 1936, Г. Билик» (KW).

ЗП; ВП; ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур. Центр. Европа (Румыния).

7. (967). **P. grossheimiana** V. Krecz. 1934, Фл. СССР, 2: 761, 477, nom. altern. — *Atropis grossheimiana* V. Krecz. 1934, l. c.: 477, 761.

Описан из Армении (оз. Севан). Тур у s: «Armenia, distr. Nor-Baiazet, prope pag. Mazra Minor, 27 VII 1928, O. Sedelmeyer et T. Heidemann» (LE!).

ЮЗ: Севан.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

Sect. 2. *Puccinellia*

8. (968). **P. choresmica** V. Krecz. 1934, Фл. СССР, 2: 761, 479, nom. altern. — *Atropis choresmica* V. Krecz. 1934, l. c.: 479, 761.

Описан из Средней Азии.

ВП: Тер.-Кум.; **ВК:** Ман.-Самур.

Вост. (юго-вост.) Европа; Ср. Азия.

9. (969). **P. distans** (Jacq.) Parl. 1848, Fl. Ital. 1: 367. — *Poa distans* Jacq. 1764, Obs. Bot. 1: 42. — *Atropis distans* (Jacq.) Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 388.

Описан из Австрии.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ.

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка.

10. (970). **P. sevangensis** Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1: 114. — *Atropis sevangensis* (Grossh.) V. Krecz. 1934, Фл. СССР, 2: 486. — *Puccinellia distans* subsp. *sevangensis* (Grossh.) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 508.

Описан из Армении. Тур у s: «Distr. Novo-Bajazet, in insula Sevan, 6300–6500', 29 VI 1923, O. Sedelmeyer» (LE!).

ВЗ: Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Севан.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

73. (164). *Sclerochloa* Beauv.

1. (971). **S. woronowii** (Hack.) Tzvel. ex Bor, 1970, in Rech. f. Fl. Iran. 70: 20; Цвел. 1957, Бот. мат. (Ленинград) 18: 27, comb. invalid. — *Scleropoa woronowii* Hack. 1912, Вестн. Тифл. бот. сада, 24: 15. — *Desmazeria woronowii* (Hack.) Ovcz. 1957, Фл. ТаджССР, 1: 194, comb. invalid.

Описан из Восточного Закавказья. Тур у s: «Prov. Elisabethpol, distr. Šuša, steppa Mil, in arenosis salsuginosis circa lac. Sor-giol, 5 V 1911, Herb. Fl. Cauc. № 56, G. Woronow» (LE!).

ВЗ: Ширв., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Мерг.-Зан.

Юго-Зап., Ср. Азия.

2. (972). **S. dura** (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 98, 177. — *Cynosurus durus* L. 1753, Sp. Pl.: 72.

Описан из Южной Европы.