

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ: Туап.-Адл., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Ю. Караб.; **Т.**

Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

74. (165). *Dactylis* L.

1. (973). *D. glomerata* L. 1753, Sp. Pl.: 71.

Описан из Европы.

1а. *D. glomerata* L. subsp. *glomerata*.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ.

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка.

1б. *D. glomerata* L. subsp. *lobata* (Drej.) Lindb. 1906. Finska Vet.-Soc. Verhandl. 38, 13: 9. — *D. glomerata* var. *lobata* Drej. 1838, Fl. Exc. Hafn.: 45. — *D. polygama* Horvát. 1874, Fl. Tyrnaviensis: 15. — *D. aschersoniana* Graebn. 1899, Notizbl. Bot. Gart. Berlin, 17: 274.

Описан из Дании.

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.

Европа.

1с. *D. glomerata* L. subsp. *woronowii* (Ovcz.) Stebbins et Zohary, 1959, Publ. Univ. Calif., Bot. 31: 9. — *D. woronowii* Ovcz. 1934, Фл. СССР, 2: 752, 362.

Описан с Копетдага.

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ; ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Юго-Зап., Ср. Азия.

1д. *D. glomerata* L. subsp. *hyrcana* Tzvel. 1976, Злаки СССР: 516. — *D. hyrcana* (Tzvel.) S. G. Mussajev, 1987, Бот. журн. 72, 1: 94.

Описан из Талыша. Турус: «АзербСССР, Талыш, у правого берега Ленкораньчая между Ленкоранью и сел. Лерик, 500 м, 1 VII 1952, И. и Н. Васильевы» (LE!).

Т.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

1е. *D. glomerata* L. subsp. *hispanica* (Roth) Nym. 1882, Consp. Fl. Eur.: 819. — *D. hispanica* Roth, 1797, Catalecta Bot. 1: 8. — *D. glomerata* var. *hispanica* (Roth) W. D. J. Koch, 1837, Syn. Fl. Germ. et Helv.: 808.

Описан из Испании.

ЗП: Аз-Куб. (Таманский п-ов); **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ; ВЗ:** Ширв., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ; Т.**

Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап. Азия.

75. (166). *Cynosurus* L.

Sect. 1. *Cynosurus*

1. (974). *C. cristatus* L. 1753, Sp. Pl.: 72.

Описан из Европы.

ЗК; ЦК; ВК: Ассо-Арг.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т:** Европа; Юго-Зап. Азия.

Sect. 2. *Falona* (Adans.) Benth.

2. (975). **C. echinatus** L. 1753, Sp. Pl.: 72. — *Falona echinata* (L.) Dumort. 1823, Obs. Gram. Belg.: 114 («Phalona»).

Описан из Южной Европы.

ЦК; Малк., В. Тер.; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т:

Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

76. (167). *Lamarckia* Moench

1. (976). **L. aurea** (L.) Moench, 1794, Meth. Pl.: 201; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 716. — *Cynosurus aureus* L. 1753, Sp. Pl.: 73.

Описан из Южной Европы.

ВЗ: Ширв. (одичавший в окр. Баку).

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия.

77. (168). *Briza* L.

Sect. 1. *Briza*

1. (977). **B. elatior** Sibth. et Smith, 1806, Fl. Graec. Prodr. 1: 59, tab. 75. — *B. australis* Prokud. 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 42. — *B. media* auct. non L.: Гросср. 1939, Фл. Кавк. изд. 2, 1: 249.

Описан из Греции.

ЗП: Аз-Куб.(юг), З. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв. (сев.- зап.), Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ; Т:**

Юго-Вост. (Балканский п-ов), Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. Азия.

Вид описан по наиболее крупноколосковым популяциям, встречающимся в Греции и на Кавказе довольно редко. Преобладают популяции, более или менее приближающиеся к равнинному европейскому виду *B. media* L. и описанные из Крыма под названием *B. australis* Prokud. — *B. elatior* var. *australis* (Prokud.) Tzvel. (1976: 522).

2. (978). **B. marcowiczii** Woronow, 1909, в Фомин и Воронов, Опр. раст. Кавк. и Крыма, 1:116.

Описан с Центрального Кавказа. Turus: «Auf Alpenwiesen in der Landschaft Ossetien in Saucalus, ca. 3000 m, 24. 07. 1899, Kneucker, Gram. Exs. № 263, B. Marcowicz» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Юго-Зап. (сев.-вост. Турция) Азия.

Sect. 2. *Brizella* Tzvel.

3. (979). **B. minor** L. 1753, Sp. Pl.: 70.

Описан из Швейцарии и Италии.

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **Т:**

Атл., Южн. Европа; Юго-Зап. Азия.