

78. (169). *Macrobriza* (Tzvel.) Tzvel.

1. (980). *M. maxima* (L.) Tzvel. 1993, Бот. журн. 78, 10: 91. — *Briza maxima* L. 1753, Sp. Pl.: 70.

Описан из Италии и Португалии.

ЗЗ: Абх., Адж.

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Сев., Южн. Африка.

79. (170). *Brizochloa* Jiras. et Chrtek

1. (981). *B. humilis* (Bieb.) Chrtek et Nadač, 1969, Candollea, 24: 170. — *Briza humilis* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 66. — *B. spicata* Sibth. et Smith, 1806, Fl. Graec. Prodr. 1: 60, tab. 77, non Burm. f. 1768, nec Lam. 1783; Некр. 1934, Фл. СССР, 2: 355.

Описан из Крыма. Лекотипус (Tzvelev, 1976: 523): «Tauria» (LE!).

ЗП: Аз-Куб. (Таманский п-ов); **СЗЗ; ЗЗ:** Абх. (окр. Сухуми).

Юго-Вост. (Балканский п-ов, Крым) Европа; Юго-Зап. Азия.

80. (171). *Cinna* L.

1. (982). *C. latifolia* (Trev.) Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 435. — *Agrostis latifolia* Trev. 1830, in Goerr. Besch. Bot. Gart. Breslau: 82.

Описан по культивировавшимся экземплярам, происходящим из Северной Америки.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк.

Сев., Вост. Европа; Сев., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

81. (172). *Pholiurus* Trin.

1. (983). *P. pannonicus* (Host) Trin. 1820, Fund. Agrost.: 131. — *Rottboellia pannonica* Host, 1801, Gram. Austr. 1: 19, tab. 24. — *Lepturus pannonicus* (Host) Kunth, 1833, Enum. Pl. 1: 462.

Описан из Венгрии.

ЗП; ВП; ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Н. Кур., Караб.; **Т.**

Центр. (юго-вост.), Южн., Вост. (юг) Европа; Сев. (юго-зап.), Юго-Зап., Ср. Азия.

82. (173). *Parapholis* C. E. Hubb.

1. (984). *P. gracilis* Bor, 1963, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 25: 63. — *Lepturus incurvatus* var. *longiflorus* Grossh. 1919, Вестн. Тифл. бот. сада, 46-47: 40, s. str. — *Parapholis longiflora* (Grossh.) S. G. Mussajev, 1987, Бот. журн. 72, 1: 94. — *Monerma cylindrica* auct. non (Willd.) Coss. et Durieu: Woronow et Schelk. 1914, Sched. Herb. Fl. Cauc.: № 113.

Описан из Ирака. Тур у s: «Iraq: Kirkuk: Jarmo E Chamchamal, № 1293, Helbaek» (W).

ВК: Кубин. (юго-вост.); **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **Т.**

Юго-Зап., Ср. Азия.

2. (985). *P. incurva* (L.) C. E. Hubb. 1946, Blumea, Suppl. 3: 14. — *Aegilops incurva* L. 1753, Sp. Pl.: 1051. — *A. incurvata* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1490, nom. illeg. — *Lepturus incurvatus* (L.) Trin. 1820, Fund. Agrost.: 123. — *Pholiurus incurvus* (L.) Schinz et Thell. 1921, Vierteljahr. Naturf. Ges. Zürich, 66: 265. — *Lepturus incurvus* (L.) Grossh. 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1: 324.