

78. (169). *Macrobriza* (Tzvel.) Tzvel.

1. (980). *M. maxima* (L.) Tzvel. 1993, Бот. журн. 78, 10: 91. — *Briza maxima* L. 1753, Sp. Pl.: 70.

Описан из Италии и Португалии.

ЗЗ: Абх., Адж.

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Сев., Южн. Африка.

79. (170). *Brizochloa* Jiras. et Chrtek

1. (981). *B. humilis* (Bieb.) Chrtek et Nadač, 1969, Candollea, 24: 170. — *Briza humilis* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 66. — *B. spicata* Sibth. et Smith, 1806, Fl. Graec. Prodr. 1: 60, tab. 77, non Burm. f. 1768, nec Lam. 1783; Некр. 1934, Фл. СССР, 2: 355.

Описан из Крыма. Лектотипус (Tzvelev, 1976: 523): «Tauria» (LE!).

ЗП: Аз-Куб. (Таманский п-ов); **СЗЗ; ЗЗ:** Абх. (окр. Сухуми).

Юго-Вост. (Балканский п-ов, Крым) Европа; Юго-Зап. Азия.

80. (171). *Cinna* L.

1. (982). *C. latifolia* (Trev.) Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 435. — *Agrostis latifolia* Trev. 1830, in Goerr. Besch. Bot. Gart. Breslau: 82.

Описан по культивировавшимся экземплярам, происходящим из Северной Америки.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк.

Сев., Вост. Европа; Сев., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

81. (172). *Pholiurus* Trin.

1. (983). *P. pannonicus* (Host) Trin. 1820, Fund. Agrost.: 131. — *Rottboellia pannonica* Host, 1801, Gram. Austr. 1: 19, tab. 24. — *Lepturus pannonicus* (Host) Kunth, 1833, Enum. Pl. 1: 462.

Описан из Венгрии.

ЗП; ВП; ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Н. Кур., Караб.; **Т.**

Центр. (юго-вост.), Южн., Вост. (юг) Европа; Сев. (юго-зап.), Юго-Зап., Ср. Азия.

82. (173). *Parapholis* C. E. Hubb.

1. (984). *P. gracilis* Bor, 1963, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 25: 63. — *Lepturus incurvatus* var. *longiflorus* Grossh. 1919, Вестн. Тифл. бот. сада, 46–47: 40, s. str. — *Parapholis longiflora* (Grossh.) S. G. Mussajev, 1987, Бот. журн. 72, 1: 94. — *Monerma cylindrica* auct. non (Willd.) Coss. et Durieu: Woronow et Schelk. 1914, Sched. Herb. Fl. Cauc.: № 113.

Описан из Ирака. Тур у s: «Iraq: Kirkuk: Jarmo E Chamchamal, № 1293, Helbaek» (W).

ВК: Кубин. (юго-вост.); **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **Т.**

Юго-Зап., Ср. Азия.

2. (985). *P. incurva* (L.) C. E. Hubb. 1946, Blumea, Suppl. 3: 14. — *Aegilops incurva* L. 1753, Sp. Pl.: 1051. — *A. incurvata* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1490, nom. illeg. — *Lepturus incurvatus* (L.) Trin. 1820, Fund. Agrost.: 123. — *Pholiurus incurvus* (L.) Schinz et Thell. 1921, Vierteljahr. Naturf. Ges. Zürich, 66: 265. — *Lepturus incurvus* (L.) Grossh. 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1: 324.

Описан «с Востока»: «In Oriente».

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Адж.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **Т:**

Атл., Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап., Ср., Южн. (зап.) Азия.

83. (174). *Monerma* Beauv.

1. (986). *M. cylindrica* (Willd.) Coss. et Durieu, 1856, Expl. Sci. Alger. 2: 214. — *Rotboellia cylindrica* Willd. 1797, Sp. Pl. 1, 1: 464. — *Hainardia cylindrica* (Willd.) Greuter, 1967, Boissiera, 13: 178.

Описан из Южной Европы.

ВЗ: Н. Кур. (близ побережья); **Т:**

Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап. Азия.

84. (175). *Sesleria* Scop.

Sect. 1. *Argenteae* Deyl

1. (987). *S. alba* Smith, 1806, in Sibth. et Smith, Fl. Graec. Prodr.: 52. — *S. anatolica* Deyl, 1946, Opera Bot. Cech. 3: 104. — *S. autumnalis* (Scop.) F. W. Schultz subsp. *anatolica* (Deyl) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 532. — *S. autumnalis* auct. non (Scop.) F. W. Schultz: Невский, 1934, Фл. СССР, 2: 301.

Описан из Турции, окр. Стамбула: «In sylvis prope pag. Belgrad».

1а. *S. alba* Smith subsp. *alba*.

ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.

Юго-Вост. (Балканский п-ов) Европа; Юго-Зап. Азия.

1б. *S. alba* Smith subsp. *voronovii* (Deyl) Tzvel. 1993, Бот. журн. 78, 10: 91. — *S. anatolica* Deyl var. *voronovii* Deyl, 1946, Opera Bot. Čech. 3: 108. — *S. autumnalis* (Scop.) F. W. Schultz subsp. *anatolica* (Deyl) Tzvel. var. *voronovii* (Deyl) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 532.

Описан из Абхазии. Тур у s: «Locus Doupera pr. Buscha, prata alpina lapid., 6600', G. Voronov» (W).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион.

Эндемик.

Sect. 2. *Sesleria*

2. (988). *S. polyathera* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 399; Цвел., 1993, Бот. журн. 78, 10: 92. — *S. heufleriana* auct. non Schur: Невский, 1936, Фл. СССР, 2: 300. — *S. phleoides* auct. non Stev.: Цвел. 1976, Злаки СССР: 533, р. р.

Описан с Западного Кавказа. Тур у s: «Prov. Vambaki in Georgia, 1831, leg. C. Koch» (В, isotypus — LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум.

Эндемик.

3. (989). *S. phleoides* Stev. ex Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg. 2: 604. — *S. caucasica* Scheele, 1844, Flora (Regensb.) 27, 4: 55.

Описан с Восточного Кавказа. Тур у s: «Caucasi orientali alpes, leg. Steven» (LE!).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Дар., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).