

Описан «с Востока»: «In Oriente».

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Адж.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **Т:**

Атл., Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап., Ср., Южн. (зап.) Азия.

83. (174). *Monerma* Beauv.

1. (986). *M. cylindrica* (Willd.) Coss. et Durieu, 1856, Expl. Sci. Alger. 2: 214. — *Rotboellia cylindrica* Willd. 1797, Sp. Pl. 1, 1: 464. — *Hainardia cylindrica* (Willd.) Greuter, 1967, Boissiera, 13: 178.

Описан из Южной Европы.

ВЗ: Н. Кур. (близ побережья); **Т:**

Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап. Азия.

84. (175). *Sesleria* Scop.

Sect. 1. *Argenteae* Deyl

1. (987). *S. alba* Smith, 1806, in Sibth. et Smith, Fl. Graec. Prodr.: 52. — *S. anatolica* Deyl, 1946, Opera Bot. Cech. 3: 104. — *S. autumnalis* (Scop.) F. W. Schultz subsp. *anatolica* (Deyl) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 532. — *S. autumnalis* auct. non (Scop.) F. W. Schultz: Невский, 1934, Фл. СССР, 2: 301.

Описан из Турции, окр. Стамбула: «In sylvis prope pag. Belgrad».

1а. *S. alba* Smith subsp. *alba*.

ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.

Юго-Вост. (Балканский п-ов) Европа; Юго-Зап. Азия.

1б. *S. alba* Smith subsp. *voronovii* (Deyl) Tzvel. 1993, Бот. журн. 78, 10: 91. — *S. anatolica* Deyl var. *voronovii* Deyl, 1946, Opera Bot. Čech. 3: 108. — *S. autumnalis* (Scop.) F. W. Schultz subsp. *anatolica* (Deyl) Tzvel. var. *voronovii* (Deyl) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 532.

Описан из Абхазии. Тур у s: «Locus Doupera pr. Buscha, prata alpina lapid., 6600', G. Voronov» (W).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион.

Эндемик.

Sect. 2. *Sesleria*

2. (988). *S. polyathera* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 399; Цвел., 1993, Бот. журн. 78, 10: 92. — *S. heufleriana* auct. non Schur: Невский, 1936, Фл. СССР, 2: 300. — *S. phleoides* auct. non Stev.: Цвел. 1976, Злаки СССР: 533, р. р.

Описан с Западного Кавказа. Тур у s: «Prov. Vambaki in Georgia, 1831, leg. C. Koch» (В, isotypus — LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум.

Эндемик.

3. (989). *S. phleoides* Stev. ex Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg. 2: 604. — *S. caucasica* Scheele, 1844, Flora (Regensb.) 27, 4: 55.

Описан с Восточного Кавказа. Тур у s: «Caucasi orientali alpes, leg. Steven» (LE!).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Дар., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Иран).

4. (990). *S. araratica* Kit Tan, 1985, in Fl. Turk. 9: 625,524; Габриэлян, 2004, Фл., растит. и раст. рес. Арм. 15: 15.

Описан из северо-восточной Турции. Туркус: «Kars: distr. Aralik, Büyük Agri Dag, above Serdar Bulak, rocky slopes, 2600–3000 m, 20 VII 1966, Davis 46963» (E).

ВЗ: Мург.-Муровд. (юго-зап.); **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев. (сев.), Севап.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

От *S. phleoides* Stev. ex Roem. et Schult. отличается волосистыми колосковыми чешуями, более длинными остями нижних цветковых чешуй (до 3.5 мм) и более узкими общими соцветиями.

85. (176). *Echinaria* Desf.

1. (991). *E. capitata* (L.) Desf. 1800, Fl. Atl. 2: 385. — *Cenchrus capitatus* L. 1753, Sp. Pl.: 1049.

Описан из Франции и Италии.

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Ю. Караб.

Атл. (юг), Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

86. (177). *Ammochloa* Boiss.

1. (992). *A. palaestina* Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. Nov., ser. 1, 13: 52.

Описан из Юго-Западной Азии (окр. г. Газа).

ВЗ: Ширв. (Апшеронский п-ов).

Атл. Европа (Испания); Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

87. (178). *Phalaroides* Wolf

1. (993). *P. arundinacea* (L.) Rausch. 1969, Feddes Repert. 79, 6: 409. — *Phalaris arundinacea* L. 1753, Sp. Pl.: 55. — *Digraphis arundinacea* (L.) Trin. 1820, Fund. Agrost.: 127.

Описан из Европы.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка.; Сев. Америка.

88. (179). *Phalaris* L.

Sect. 1. *Bulbophalaris* Tzvel.

1. (994). *P. aquatica* L. 1755, Cent. Pl. 1: 4; Цвел., 1993, Бот. журн. 78, 10: 92. — *P. tuberosa* L. 1771, Mantissa Alt.: 557. — *P. bulbosa* auct. non L.: Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 52.

Описан из Египта и Италии.

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **Т.**

Южн. Европа; Юго-Зап., Южн. Азия.

Sect. 2. *Paraphalaris* Tzvel.

2. (995). *P. minor* Retz. 1783, Obs. Bot. 3: 8.

Описан из Индии.

ВК: Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (заносный в Адлере), Абх. (заносный близ устья р. Гумиста), Адж. (заносный в окр. Батуми); **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **Т.**

Южн. Европа; Юго-Зап., Ср., Южн. Азия.