

8. (625). **A. hajastanicum** Tzvel. 1966, Новости сист. высш. раст. 1966: 292. — *x Agrotirigia hajastanica* (Tzvel.) Tzvel. 1972, Новости сист. высш. раст. 9: 63.

Описан из Армении. Турус: «Агинский р-н, каменистые степные склоны между ст.Ани и Баграван, в 2–3 км к югу от ст. Баграван, 1500 м, 5 VII 1960, № 842, Н. Цвелев, С. Черепанов» (LE!).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев.

Юго-Зап. Азия.

По строению колосьев экземпляры сходны с растениями *A. desertorum*, но листья более широкие и имеются коротко ползучие подземные побеги. Вполне вероятно, что этот вид произошел от гибридизации *Agropyron pectinatum* *x Elytrigia repens* или является современным гибридом такого происхождения. Гибриды *A. pectinatum* *x E. repens* s. l. указывались и для других районов Кавказа (например, для Карачаево-Черкесии — Дзыбов, Танфильев, 1979, Флора Сев. Кавк. и вопросы ее истории, 3: 107, и Армении — Гандилян, 1987, Биол. журн. Арм. 40, 8: 684, как *A. x subaristatton Gandiljan* nom. nud.).

9. (100). **Eremopyrum** (Ledeb.) Jaub. et Spach

Sect. 1. **Eremopyrum**

1. (626). **E. orientale** (L.) Jaub. et Spach, 1851, Ill. Pl. Or. 4: 26. — *Secale orientale* L. 1753, Sp. Pl.: 84. — *Triticum orientale* (L.) Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 86. — *Agropyron orientale* (L.) Roem. et Schult. 1817, Syst. Nat. 2: 757.

Описан с островов в Эгейском море: «... ad Archipelagum».

ЗП; **ВП;** **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т.**

Южн. (вост.), Юго-Вост., Вост. (юг) Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Африка.

2. (627). **E. bonaepartis** (Spreng.) Nevski, 1933, Тр. Бот. ин-та АН СССР, сер. 1, 1: 18, in obs. — *Triticum bonaepartis* Spreng. 1801, Erst. Nachr. Bot. Gart. Halle: 40. — *T. squarrosum* Roth, 1802, Neue Beitr. Bot.: 128. — *Agropyron bonaepartis* (Spreng.) T. Durand et Schinz, 1894, Consp. Fl. Afr. 5: 936.

Описан из Египта.

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Занг., Мерги.-Зан.; **Т** (Зувант).

Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Африка.

3. (628). **E. hirsutum** (Bertol.) Nevski, 1934, Фл. СССР, 2: 663. — *Hordeum hirsutum* Bertol. 1842, Misc. Bot. 1: 11. — *Agropyron orientale* var. *sublanuginosum* Drob. 1916, Тр. Бот. муз. Акад. наук, 16: 35. — *Eremopyrum bonaepartis* subsp. *sublanuginosum* (Drob.) Á. Löve, 1952, Ark. Bot. (Stockholm), ser. 2, 2: 305. — *E. bonaepartis* subsp. *hirsutum* (Bertol.) Melderis, 1984, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 42: 81.

Описан из басс. р. Евфрат (Сирия).

ЮЗ: Нах., Ю. Караб.

Юго-Зап., Ср. Азия.

4. (629). **E. distans** (C. Koch) Nevski, 1933, Тр. Бот. ин-та АН СССР, сер. 1, 1: 18, in obs. — *Agropyron distans* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 426. — *Triticum orientale* var. *lanuginosum* Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 337. — *Agropyron lasianthum* Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. Nov., ser. 1, 13: 68. — *A. orientale* subsp. *lanuginosum* (Griseb.) K. Richt. 1890, Pl. Europ. 1: 126.

Описан из Армении. Lectotypus (Цвелев, 1976: 152): «Armenia, apud Aschtarak et ultra Arahzen fluv. apud Amarath, 1838, № 636, С. Koch» (LE! cum isoelectotypi).

ВП: Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур. (близ побережья); **ЦЗ:** Триал.-Н.Карт; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ;** Т.

Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Африка.

Sect. 2. *Micropyron* Nevski

5. (630). **E. triticeum** (Gaertn.) Nevski, 1933, Тр. Бот. ин-та АН СССР, сер. 1, 1: 18, in obs. — *Agropyron triticeum* Gaertn. 1770, Novi Comment. Acad. Sci. Petropol. 14, 1: 540. — *Secale prostratum* Pall. 1771, Reise, 1: 168, 485. — *Agropyron prostratum* (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 146.

Описан из бассейна р. Урал.

ЗП; **ВП;** **ЦК;** **ВК;** **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ;** Т.

Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.

10. (101). *Heteranthelium* Hochst.

1. (631). **H. piliferum** (Banks et Soland.) Hochst. 1843, in Kotschy, Pl. Aleppo: 130. — *Elymus pilifer* Banks et Soland. 1794, in Russell, Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 244.

Описан из Сирии (окр. Халеба). Турus: «Aleppo, Russell» (ВМ).

ЮЗ.

Юго-Зап., Ср., Южн. (Гималаи) Азия.

11. (102). *Amblyopyrum* (Jaub. et Spach) Eig

1. (632). **A. muticum** (Boiss.) Eig, 1929, Agr. Rec. (Tel-Aviv), 2: 200. — *Aegilops mutica* Boiss. 1844, Diagn. Pl. Or. Nov. 1, 5: 73. — *A. loliacea* Jaub. et Spach, 1851, Ill. Pl. Or. 4: 23, tab. 317.

Описан из Турции. Турus: «In Cappadocia ad Euphratem, Aucher 2977» (G).

ЗЗ: Адж. (долина Чороха); **ЮЗ:** Ерев.

Юго-Зап. Азия (Турция).

В Армении, как и в Турции, встречаются две разновидности этого вида: var. *muticum* — с волосистыми колосками и var. *loliaceum* (Jaub. et Spach) Eig — с голыми колосками.

12. (103). *Aegilops* L.

Subgen. 1. *Sitopsis* Jaub. et Spach

1. (633). **A. speltoides** Tausch, 1837, Flora (Regensb.) 22: 108; Мусаев, 1991, Злаки Азерб.: 51. — *A. aucheri* Boiss. 1844, Diagn. Pl. Or. Nov., ser. 1, 5: 74; Мусаев, 1991, Злаки Азерб.: 51. — *Triticum speltoides* (Tausch) Gren. ex K. Richt. 1890, Pl. Europ. 1: 129. — *Sitopsis speltoides* (Tausch) Á. Löve, 1984, Feddes Repert. 95, 7-8: 491.

Описан по культивируемым образцам неизвестного происхождения.

ВЗ: Ширв. (Апшеронский п-ов).

Юго-Вост. Европа (европейская Турция); Юго-Зап. Азия.