

ЮЗ: Дар., Нах., Занг.
Юго-Зап. Азия.

11. (1044). *M. inaequiglumis* Boiss. 1846, Diagn. Pl. Or. ser. 1, 7: 124. — *M. persica* subsp. *inaequiglumis* (Boiss.) Bor, 1970, in Rech. f. Fl. Iran. 70: 255.

Описан из Ирана. Т у р u s: «Pl. Pers. austr. № 315, ad saxa prope urb. Schiras, 1. 05. 1842, Th. Kotschy» (G, isotypus — LE!).

ЮЗ: Ерев., Нах.
Юго-Зап., Ср., Южн. (Гималаи) Азия.

12. (1045). *M. atropatana* Schischk. 1922, Бюл. Муз. Грузии, 1: 1; Лавр. 1934, Фл. СССР, 2: 343. — *M. persica* subsp. *atropatana* (Schischk.) Tzvel. 1973, Новости сист. высш. раст. 10: 85.

Описан из Нахичевани. Т у р u s: «Скалы холмистой гряды между Ордубадам и Акулисом, 19. 05. 1914, Ю. Воронов» (TGM, isotypus — LE!).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Занг.
Юго-Зап. (Иран), Ср. (Туркмения) Азия.

Tribus 6. **Stipeae** Dumort.

95. (186). **Achnatherum** Beauv.

Sect. 1. **Neotrinia** Tzvel.

1. (1046). *A. caragana* (Trin.) Nevski, 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 4: 224, 337. — *Stipa caragana* Trin. 1830, Мém. Acad. Sci. Pétersb. ser. 6, Sci. Nat. 1: 74. — *Lasiagrostis caragana* (Trin.) Trin. et Rupr. 1843, Мém. Acad. Sci. Pétersb., ser. 6, 7, 2, Sci. Nat. 5: 90. — *Oryzopsis pallezens* G. Westb. 1904, Acta Horti Bot. Univ. Jurjev, 5: 147.

Описан с восточного побережья Каспийского моря. L e c t o t y p u s (Цвелев, 1976: 564): «Littora orientalia maris Caspium ad prom. Thuk-Caragan, leg. Eichwald» (LE!).

ЗК: Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** ЦЗ: Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд; **ЮЗ:** Занг.

Сев., Ср., Центр. Азия.

2. (1047). *A. roshevitzii* S. G. Mussajev, 1976, Докл. АН АзербССР, 32, 2: 54.

Описан с Восточного Кавказа. Т у р u s: «Azerbaidzhan, distr. Konachkend, prope pag. Konachkend, in declivibus argillosis, 24. 09. 1938, V. Petrov et M. Shelkanov» (ВАК).

ВК: Кубин.

Эндемик.

Самостоятельность этого вида, экземпляров которого мы не видели, вызывает большие сомнения, как и принадлежность его к роду *Achnatherum*. В первоописании для него указываются голые колосковые чешуи 3–4 мм дл., голые членики оси колоска, нижние цветковые чешуи 4 мм дл. без остей, прижатоволосистые зерновки на брюшной стороне с глубокими бороздками. Автор отличает свой вид от *A. caragana* по следующим особенностям: прижатоопушенные колосковые чешуи (а в диагнозе они голые), голая и гладкая ось колоска (которой у видов *Achnatherum* нет!) и цветковые чешуи с коричневыми «безостыми» волосками (непонятно, что значит «безостыми!»)

3. (1048). **A. ordubadense** Tzvel. 1993, Бот. журн. 78, 10: 93. — *Stipa caragana* auct. non Trin.: Bor, 1970, in Rech. f. Fl. Iran. 70: 382, p. p.; H. Scholz, 1985, in P. H. Davis, Fl. Turk. 9: 543.

Описан из Нахичевани. Тур у s: «Нахичеванская АССР, Ордубадский р-н, трещины скал по склону отрога Зангезурского хребта в 2 км к востоку от г. Ордубад, 9. 06. 1956, № 426, Т. Егорова, С. Черепанов, Н. Цвелев» (LE!).

ЮЗ: Нах. (окр. Ордубада).

Юго-Зап. (сев.-вост. Турция, Иран) Азия.

Sect. 2. *Aristella* (Trin.) Tzvel.

4. (1049). **A. bromoides** (L.) P. Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 146. — *Agrostis bromoides* L. 1767, Mantissa, 1: 30. — *Aristella bromoides* (L.) Bertol. 1833, Fl. Ital. 1: 690. — *Stipa bromoides* (L.) Doerfl. 1897, Herb. Norm. 34: 129; Bor, 1970, in Rech. f. Fl. Iran. 70: 382; H. Scholz, 1985, in P. H. Davis, Fl. Turk. 9: 543. — *Lasiagrostis bromoides* (L.) Nevski et Roshev. 1934, Фл. СССР, 2: 72.

Описан из Южной Франции.

ВК; СЗЗ; ЗЗ: Адж.; **ВЗ:** Алаз.-Агртч., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан.; **Т:**

Южн., Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия.

Sect. 3. *Protostipa* Tzvel.

5. (1050). **A. sibiricum** (L.) Keng ex Tzvel. 1977, Пробл. экол., геобот., бот. геогр. и флорист.: 140; Keng, 1957, Clav. Gen. et Sp. Gram. Prim. Sin.: 212, comb. invalid. — *Avena sibirica* L. 1753, Sp. Pl.: 79. — *Stipa sibirica* (L.) Lam. 1791, Tabl. Encycl. Meth. Bot. 1: 158.

Описан из Сибири.

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.

Сев., Ср., Центр., Вост. Азия.

96. (187). *Stipa* L.

Subgen. 1. *Stipa*

Sect. 1. *Barbatae* Junge

1. (1051). **S. sosnowskyi** Seregin, 1961, Бот. мат. (Ленинград) 21: 58.

Описан с Восточного Кавказа. Тур у s: «Дагестанская АССР, Курахский р-н, в 2 км к вост. от сел. Курах по юго-вост. щебнистому склону к р. Курахчай, 1939, Л. Чиликина» (LE!).

ВК: Ман.-Самур. (юг).

Эндемик.

2. (1052). **S. daghestanica** Grossh. 1919, Вестн. Тифл. бот. сада, 46–47: 29.

Описан из Дагестана. Тур у s: «Андийский и Гунибский округа, 4000–6000', на сухих склонах и известняках, VI. 1915, А. Гроссгейм» (TGM).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.

Эндемик.