

26a. *S. caucasica* Schmalh. subsp. *caucasica*.

ЦК; ВК; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг. Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

26b. *S. caucasica* Schmalh. subsp. *drobovii* Tzvel. 1974, Новости сист. высш. раст. 11: 20. — *S. bella* Drob. 1925, Feddes Repert. 21: 37, non Phil. 1870; Гроссг. 1949, Опред. раст. Кавк.: 683. — *S. drobovii* (Tzvel.) Czer. 1981, Сосуд. раст. СССР: 387.

Описан из Южного Казахстана.

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

26с. *S. caucasica* Schmalh. subsp. *desertorum* (Roshev.) Tzvel. 1974, Новости сист. высш. раст. 11: 20. — *S. caucasica* f. *desertorum* Roshev. 1916, в Б. Федч. Фл. аз. Росс. 12: 143. — *S. caucasica* var. *desertorum* (Roshev.) Tzvel. 1968. Раст. Центр. Азии, 4: 53.

Описан с Тянь-Шаня.

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. (Иран), Ср., Центр. Азия.

Subgen. 2. *Stipella* (Tzvel.) Tzvel.

27. (1077). *S. capensis* Thunb. 1794, Prodr. Fl. Cap.: 19. — *S. tortilis* Desf. 1798, Fl. Atl. 1: 99, tab. 31, fig. 1.

Описан из Южной Африки.

ВЗ: Ширв. (Апшеронский п-ов).

Юго-Зап., Ср. (Туркмения), Южн. Азия; Ср., Южн. Африка.

97. (188). *Piptatherum* Beauv.

Sect. 1. *Piptatherum* Beauv.

1. (1078). *P. virescens* (Trin.) Boiss. 1884, Fl. Or. 5: 507. — *Urachne virescens* Trin. 1824, Gram. Unifl. 1: 173. — *Oryzopsis virescens* (Trin.) G. Beck, 1890, Fl. Nieder-Oesterr. 1: 51.

Описан с Балканского п-ва (Краинка).

ЗП: З. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. Азия.

Sect. 2. *Holciformia* Roshev. ex Tzvel.

2. (1079). *P. holciforme* (Bieb.) Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg. 2: 328. — *Agrostis holciformis* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 54. — *Oryzopsis holciformis* (Bieb.) Hack. 1885, Denkschr. Oesterr. Akad. Wiss. (Math.-Naturw.) 50, 2: 8.

Описан из Крыма. Турус: «In Tauria meridionali circa pag. Alupkam» (LE!).

ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **СЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд. Караб.; **ЮЗ; Т:**

Юго-Вост. Европа (Крым); Юго-Зап., Ср. Азия.

3. (1080). *P. molinioides* Boiss. 1846, Diagn. Pl. Or. ser. 1, 7: 121. — *Oryzopsis molinioides* (Boiss.) Hack. 1903, Kjoeb. Vid. Meddel. 1903: 165, quoad nom.; Гроссг. 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1: 159.

Описан из Ирана. *Typus*: «Pl. Persiae austr., prope fontem Dscheschme-Pias in monte Kuh-Daena, 29 V 11 1842, № 755a, Th. Kotschy» (G, isotypus — LE!).

Указан для ЮЗ: Нах. (Урмыс) (Гроссг. 1939 : 159).

Юго-Зап. Азия.

Tribus 8. *Nardeae* Anderss.

98. (189). *Nardus* L.

1. (1081). *N. stricta* L. 1753, Sp. Pl.: 53. — *N. glabriculumis* Sakalo, 1941, Учен. зап. Харк. держ. унів. 22, Тр. інст. бот. 4: 153.

Описан из Северной Европы.

ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Севан., Дар., Занг.

Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция) Азия; Сев. Америка.

Высокогорные популяции с голыми и гладкими (а не с более или менее шероховатыми) стеблями принадлежат разновидности *var. glabriculumis* (Sakalo) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 561.

Tribus 8. *Oryzeae* Dumort.

99. (190). *Leersia* Sw.

1. (1082). *L. oryzoides* (L.) Sw. 1797, Fl. Ind. Occid. 1: 132. — *Phalaris oryzoides* L. 1753, Sp. Pl.: 55.

Описан из Северной Америки.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК: Ассо-Агр.; **ЗЗ; ВЗ:** Ширв. (окр. пос. Ханлар), Мург.-Муровд. (окр. Кировабада); **ЮЗ:** Ерев.

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Вост. Азия; Сев. Америка.

Вид близкого рода — *Oryza sativa* L., рис — культивируется в ряде районов.

100. (191). *Zizania* L.

1. (1083). *Z. latifolia* (Griseb.) Stapf, 1909, Kew Bull. 1909: 385. — *Hydropyrum latifolium* Griseb. 1853, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 466.

Описан из Забайкалья.

ЗП: Аз.-Куб. (плавни Кубани); **ЗЗ:** Абх. (оз. Бебесыр), интродуцированный и натурализовавшийся вид.

Сев. (юго-вост.), Вост. Азия.

2. (1084). *Z. palustris* L. 1771, Mant. Pl. 2: 295. — *Z. aquatica* var. *angustifolia* Hitchc. 1906, Rhodora, 8: 210. — *Z. aquatica* subsp. *angustifolia* (Hitchc.) Tzvel. 1971, Новости сист. высш. раст. 8: 73. — *Z. aquatica* auct. non L.: Мусаев, 1991, Злаки Азерб.: 30.

Описан из Канады.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВК:** Кубин. (оз. Шилиянгель Дивичинского р-на Азербайджана), интродуцированный и натурализовавшийся вид.

Сев. Америка.