

Описан из Ирана. *Typus*: «Pl. Persiae austr., prope fontem Dscheschme-Pias in monte Kuh-Daena, 29 V 11 1842, № 755a, Th. Kotschy» (G, isotypus — LE!).

Указан для ЮЗ: Нах. (Урмыс) (Гроссг. 1939 : 159).

Юго-Зап. Азия.

Tribus 8. *Nardeae* Anderss.

98. (189). *Nardus* L.

1. (1081). *N. stricta* L. 1753, Sp. Pl.: 53. — *N. glabriculumis* Sakalo, 1941, Учен. зап. Харк. держ. унів. 22, Тр. інст. бот. 4: 153.

Описан из Северной Европы.

ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Севан., Дар., Занг.

Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция) Азия; Сев. Америка.

Высокогорные популяции с голыми и гладкими (а не с более или менее шероховатыми) стеблями принадлежат разновидности *var. glabriculumis* (Sakalo) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 561.

Tribus 8. *Oryzeae* Dumort.

99. (190). *Leersia* Sw.

1. (1082). *L. oryzoides* (L.) Sw. 1797, Fl. Ind. Occid. 1: 132. — *Phalaris oryzoides* L. 1753, Sp. Pl.: 55.

Описан из Северной Америки.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК: Ассо-Агр.; **ЗЗ; ВЗ:** Ширв. (окр. пос. Ханлар), Мург.-Муровд. (окр. Кировабада); **ЮЗ:** Ерев.

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Вост. Азия; Сев. Америка.

Вид близкого рода — *Oryza sativa* L., рис — культивируется в ряде районов.

100. (191). *Zizania* L.

1. (1083). *Z. latifolia* (Griseb.) Stapf, 1909, Kew Bull. 1909: 385. — *Hydropyrum latifolium* Griseb. 1853, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 466.

Описан из Забайкалья.

ЗП: Аз.-Куб. (плавни Кубани); **ЗЗ:** Абх. (оз. Бебесыр), интродуцированный и натурализовавшийся вид.

Сев. (юго-вост.), Вост. Азия.

2. (1084). *Z. palustris* L. 1771, Mant. Pl. 2: 295. — *Z. aquatica* var. *angustifolia* Hitchc. 1906, Rhodora, 8: 210. — *Z. aquatica* subsp. *angustifolia* (Hitchc.) Tzvel. 1971, Новости сист. высш. раст. 8: 73. — *Z. aquatica* auct. non L.: Мусаев, 1991, Злаки Азерб.: 30.

Описан из Канады.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВК:** Кубин. (оз. Шилиянгель Дивичинского р-на Азербайджана), интродуцированный и натурализовавшийся вид.

Сев. Америка.