

144. (235). *Coix* L.

1. (1190). *C. lacryma-jobi* L. 1753, Sp. Pl.: 972.

Описан из Индии.

**ЗК** (Краснодар); **ЦК**; **ЗЗ**: Адж. (в культуре и одичавший).

Южн. Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Юго-Вост., Южн. Азия.

**Subclassis Alismatidae**

**Superordo Alismatanae**

**ORDO 20. BUTOMALES**

**Fam. 179. Butomaceae Mirb.\***

**1. (236). Butomus L.**

1. (1191). *B. umbellatus* L. 1753, Sp. Pl.: 372.

Описан из Европы.

**ЗП**; **ВП**; **ЗК**: Бело-Лаб.; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Лори; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ**; **Т**.

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия.

**ORDO 21. HYDROCHARITALES**

**Fam. 180. Hydrocharitaceae Juss.\*\***

1. (237). *Hydrocharis* L. 1753, Sp. Pl.: 1036.

(1192). *H. morsus-ranae* L. 1753, Sp. Pl.: 1036.

Описан из Европы.

**ЗП**: Аз.-Куб.; **ВП**: Тер.-Кум.; **ЗЗ**: Абх., Инг.-Рион.; **Т**.

Указан для **ВП**: В. Ставр., Тер.-Сулак. (Галушко, 1978, 1: 50; Гроссгейм, 1939: 102, 103); **ЗК** (Гроссгейм, 1928: 44); **ЗЗ**: Туап.-Адл., Адж. (Гроссгейм, 1939: 103; Дмитриева, 1990: 133); **ВЗ**: Алаз.-Агрнич. (Алоева, 1987, Сообщ. АН ГрузССР, 127, 2: 362).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Ср. Азия; Сев. Африка (сев.-зап.).

**2. (238). Stratiotes L.**

(1193). *S. aloides* L. 1753, Sp. Pl.: 535.

Описан из Сев. Европы.

**ЗП**: Аз.-Куб.

Указан для: **ЗК**; **ЦК**; **ВК**: Ассо-Арг. (Гроссгейм, 1928: 44).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Средиз.; Сев. Азия.

---

\*Н. Н. Цвелев

\*\*В. В. Шванова

### 3. (239). *Egeria* Planch.

(1194). **E. densa** Planch. 1849, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 3, 11: 80. — *Elodea densa* (Planch.) Casp. 1857, Monatsb. Koenigl. Acad. Wiss. Berlin: 49.

Описан из Аргентины.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦК:** Малк.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Вост. Азия; Сев. Африка; Сев., Центр., Южн. Америка; Австралия; Новая Зеландия.

Первые вид был указан для Кавказа (в пределах г. Краснодара) Н. Н. Цвелевым и В. Д. Бочкиным (1992). Различия в морфологии представителей *Elodea* и *Egeria* даны в публикации о находке *Egeria densa* в Крыму (Бялт, Орлова, 2003). Вид, найденный в Кабардино-Балкарии («Кабардино-Балкария, г. Нальчик, северная окраина, в водоеме отстойника очистных сооружений. 7.12.1997. А. Якимов, Х. Гузиев, Н. Цепкова») и приводимый как *Elodea canadensis* (Цепкова и др., 1998), по-видимому, тоже относится к *Egeria densa* (Цепкова, Якимов, 2005. Бот. журн. 2005, 90, 8: 1253–1254).

### 4. (240). *Elodea* Michx.

(1195). **E. canadensis** Michx. 1803, Fl. Bor.-Amer. 1: 20.

Описан из Канады.

Указан для **ЗЗ:** Абх. (Читанова, 2004: 210), Адж. (Дмитриева, 1990: 133).

Атл., Сев., Вост., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Азия; Сев. Америка; Австралия, Новая Зеландия.

В Гербарии Ботанического института РАН нет сборов этого вида с Кавказа.

### 5. (241). *Vallisneria* L.

(1196). **V. spiralis** L. 1753, Sp. Pl.: 1015.

Описан из Италии.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗЗ:** Абх.

Указан для **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗП:** З. Ставр. (Галушко, 1978, 1: 49).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Вост. Азия; Сев. Африка (сев.-зап.); Сев. Америка.

## ORDO 22. NAJADALES

### Fam. 181. *Najadaceae* Juss.\*

#### 1. (242). *Najas* L.

(1197). **N. marina** L. 1753, Sp. Pl.: 1015; Барсебян, 1972, Биол. журн. Арм. 25, 1: 70.

Описан с морских побережий Европы.

a. **N. marina** L. subsp. **marina**.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур. Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Америка.

b. **N. marina** L. subsp. **aculeolata** Tzvel. 1976, Новости сист. высш. раст. 13: 17.

Описан из Калмыцкой АССР. Турпис: «Калмыцкая АССР, Сарпинские озера, оз. Ханата, плес Цаган-Усун, 22 VIII 1958, В. Катанская» (LE!).

\*Н. Н. Цвелев