

3. (239). *Egeria* Planch.

(1194). **E. densa** Planch. 1849, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 3, 11: 80. — *Elodea densa* (Planch.) Casp. 1857, Monatsb. Koenigl. Acad. Wiss. Berlin: 49.

Описан из Аргентины.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦК:** Малк.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Вост. Азия; Сев. Африка; Сев., Центр., Южн. Америка; Австралия; Новая Зеландия.

Первые вид был указан для Кавказа (в пределах г. Краснодара) Н. Н. Цвелевым и В. Д. Бочкиным (1992). Различия в морфологии представителей *Elodea* и *Egeria* даны в публикации о находке *Egeria densa* в Крыму (Бялт, Орлова, 2003). Вид, найденный в Кабардино-Балкарии («Кабардино-Балкария, г. Нальчик, северная окраина, в водоеме отстойника очистных сооружений. 7.12.1997. А. Якимов, Х. Гузиев, Н. Цепкова») и приводимый как *Elodea canadensis* (Цепкова и др., 1998), по-видимому, тоже относится к *Egeria densa* (Цепкова, Якимов, 2005. Бот. журн. 2005, 90, 8: 1253–1254).

4. (240). *Elodea* Michx.

(1195). **E. canadensis** Michx. 1803, Fl. Bor.-Amer. 1: 20.

Описан из Канады.

Указан для **ЗЗ:** Абх. (Читанава, 2004: 210), Адж. (Дмитриева, 1990: 133).

Атл., Сев., Вост., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Азия; Сев. Америка; Австралия, Новая Зеландия.

В Гербарии Ботанического института РАН нет сборов этого вида с Кавказа.

5. (241). *Vallisneria* L.

(1196). **V. spiralis** L. 1753, Sp. Pl.: 1015.

Описан из Италии.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗЗ:** Абх.

Указан для **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗП:** З. Ставр. (Галушко, 1978, 1: 49).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Вост. Азия; Сев. Африка (сев.-зап.); Сев. Америка.

ORDO 22. NAJADALES

Fam. 181. *Najadaceae* Juss.*

1. (242). *Najas* L.

(1197). **N. marina** L. 1753, Sp. Pl.: 1015; Барсебян, 1972, Биол. журн. Арм. 25, 1: 70.

Описан с морских побережий Европы.

a. **N. marina** L. subsp. **marina**.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур. Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Америка.

b. **N. marina** L. subsp. **aculeolata** Tzvel. 1976, Новости сист. высш. раст. 13: 17.

Описан из Калмыцкой АССР. Турис: «Калмыцкая АССР, Сарпинские озера, оз. Ханата, плес Цаган-Усун, 22 VIII 1958, В. Катанская» (LE!).

*Н. Н. Цвелев

ВП: Тер.-Сулак.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **Т.**

Южн., Вост. (юго-восток) Европа; **Юго-Зап., Ср.** Азия.

Этот подвид, по-видимому, является результатом гибридизации subsp. *marina* с африканским подвидом subsp. *armata* (Lindb. f.) Horn af Rantzien (= *N. delilei* Rouy), экземпляры которого имеют значительно более колючие стебли и листья.

2. (243). *Caulinia* Willd.

1. (1198). *C. minor* (All.) Coss. et Germ. 1845, Fl. Paris. 2: 579. — *Najas minor* All. 1773, Auct. Syn. Stirp. Horti Taur.: 3.

Описан из Италии.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Адж.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т.**

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; **Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост.** Азия; **Сев.** Африка.

2. (1199). *C. graminea* (Delile) Tzvel. 1976, Новости сист. высш. раст. 13: 20. — *Najas graminea* Delile, 1813, Descrt. Egypte Hist. Nat. 2: 282.

Описан из Египта.

ВК: Кубин.; **ВЗ:** Н. Кур.; **Т.**

Юго-Зап., Ср., Южн. Азия; **Сев., Центр.** Африка; **Австралия.**

3. (1200). *C. orientalis* (Triest et Uotila) Tzvel. 1987, Сосуд. раст. сов. Дальн. Вост. 2: 344. — *Najas orientalis* Triest et Uotila, 1986, Ann. Bot. Fenn. 23: 169. — *N. foveolata* auct. non A. Br. ex Magnus: Косенко, 1970, Опред. высш. раст. сев.-зап. Кавк. и Предкавк.: 457.

Описан из Японии.

ЗП: Аз.-Куб. (сорный, заносный).

Вост. Азия.

ORDO 23. ALISMATALES

Fam. 182. *Alismataceae* Vent.*

1. (244). *Alisma* L.

1. (1201). *A. plantago-aquatica* L. 1753, Sp. Pl.: 343.

Описан из Европы.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср.; Центр., Вост., Азия; Сев., Центр. Африка.

2. (1202). *A. orientale* (Sam.) Juz. 1934, Фл. СССР, 1: 281. — *A. plantago-aquatica* var. *orientale* Sam. 1926, Acta Horti Gotoburg, 2: 84.

Описан из Китая.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Косенко, 1970: 458), заносный.

Вост. Азия.

3. (1203). *A. lanceolatum* With. 1796, Arrang. Brit. Pl., ed. 3, 2: 362.

Описан из Великобритании.

*Н. Н. Цвелев