

**ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **Т:**

**Южн., Вост.** (юго-восток) Европа; **Юго-Зап., Ср.** Азия.

Этот подвид, по-видимому, является результатом гибридизации subsp. *marina* с африканским подвидом subsp. *armata* (Lindb. f.) Horn af Rantzien (= *N. delilei* Rouy), экземпляры которого имеют значительно более колючие стебли и листья.

## 2. (243). *Caulinia* Willd.

1. (1198). *C. minor* (All.) Coss. et Germ. 1845, Fl. Paris. 2: 579. — *Najas minor* All. 1773, Auct. Syn. Stirp. Horti Taur.: 3.

Описан из Италии.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Адж.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка.

2. (1199). *C. graminea* (Delile) Tzvel. 1976, Новости сист. высш. раст. 13: 20. — *Najas graminea* Delile, 1813, Descrt. Egypte Hist. Nat. 2: 282.

Описан из Египта.

**ВК:** Кубин.; **ВЗ:** Н. Кур.; **Т:**

Юго-Зап., Ср., Южн. Азия; Сев., Центр. Африка; Австралия.

3. (1200). *C. orientalis* (Triest et Uotila) Tzvel. 1987, Сосуд. раст. сов. Дальн. Вост. 2: 344. — *Najas orientalis* Triest et Uotila, 1986, Ann. Bot. Fenn. 23: 169. — *N. foveolata* auct. non A. Br. ex Magnus: Косенко, 1970, Опред. высш. раст. сев.-зап. Кавк. и Предкавк.: 457.

Описан из Японии.

**ЗП:** Аз.-Куб. (сорный, заносный).

Вост. Азия.

## ORDO 23. ALISMATALES

### Fam. 182. *Alismataceae* Vent.\*

#### 1. (244). *Alisma* L.

1. (1201). *A. plantago-aquatica* L. 1753, Sp. Pl.: 343.

Описан из Европы.

**ЗП;** **ВП;** **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т:**

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср.; Центр., Вост., Азия; Сев., Центр. Африка.

2. (1202). *A. orientale* (Sam.) Juz. 1934, Фл. СССР, 1: 281. — *A. plantago-aquatica* var. *orientale* Sam. 1926, Acta Horti Gotoburg, 2: 84.

Описан из Китая.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Косенко, 1970: 458), заносный.

Вост. Азия.

3. (1203). *A. lanceolatum* With. 1796, Arrang. Brit. Pl., ed. 3, 2: 362.

Описан из Великобритании.

\*Н. Н. Цвелев

**ЗП; ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Севан.; **Т:** Европа; Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Африка.

4. (1204). **A. gramineum** Lej. 1811, Fl. Spa, 1: 175. — *A. loeselii* Gorski, 1830, in Eichw., Skizze: 127. — *A. arcuatum* Michal. 1854, Bull. Soc. Bot. Fr. 1: 312.

Описан из Бельгии.

**ЗП; ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗ:**

Указан для **ЗЗ:** Абх. (Колаковский, 1986: 103).

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка.

## 2. (245). *Caldesia* Parl.

1. (1205). **C. parnassifolia** (Bassi) Parl. 1854, Nuovi Gen. Sp. Monocot.: 57. — *Alisma parnassifolium* L. 1768, Syst. Nat., ed. 12, 3: 230.

Описан из Италии.

**ЗЗ:** Абх. (оз. Бебесыр).

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. Азия (Алтай); Африка.

## 3. (246). *Damasonium* Mill.

1. (1206). **D. alisma** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: №3. — *Alisma damasonium* L. 1753, Sp. Pl.: 343.

Описан из Великобритании и Франции.

**ВЗ:** Н. Кур.; **Т:**

Атл., Центр., Южн. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

## 4. (247). *Sagittaria* L.

1. (1207). **S. sagittifolia** L. 1753, Sp. Pl.: 993.

Описан из Европы.

**ЗП; ВП; ЦЗ:** Лори; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан.

Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр. Азия.

2. (1208). **S. trifolia** L. 1753, Sp. Pl.: 993.

Описан из Китая.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗЗ; ЦЗ:** Лори; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Вост. Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Юго-Вост., Южн. Азия.

3. (1209). **S. platyphylla** (Engelm.) J. G. Smith, 1894, Rep. Miss. Bot. Gard. 6, 4: 29, tab. 26. — *S. graminea* Michx. var. *platyphylla* Engelm. 1867, in A. Gray, Man. Bot., ed. 5: 494. — *S. graminea* auct. non Michx.: Юз. 1934, Фл. СССР, 1: 291.

Описан из Северной Америки.

**ЗЗ:** Адж. (в окр. Батуми, одичавший).

Сев. Америка.