

Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия (распространение не выяснено).

К этому виду, распространение которого еще недостаточно известно, мы относим широколистные популяции *P. pectinatus* s.l., отличающиеся от широколистных речных популяций этого вида более жесткими листовыми пластинками с 3 сосудистыми пучками, несущими механическую ткань, и также более жесткими и более широкими влагалищами листьев основных стеблей. В отличие от видов *P. amblyophyllus* С. А. Мей. и *P. vaginatus* Turcz. экземпляры *P. intramongolicus* имеют постепенно заостренные, а не притупленные верхушки листьев. Автор *P. intramongolicus* в ключе для определения видов и в подписи к рисунку по ошибке дал ему другое название — *P. acifolius* Ma.

16. (1228). **P. amblyophyllus** С. А. Мей. 1849, Beitr. Pfl. Russ. Reich. 6: 10.

Описан с Центрального Кавказа. Т у р у s: «Georgia, Kasbek, leg. Kolenati» (LE!).

ЦК: В. Тер.; ВК: Кубин.; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; ЮЗ: Севан.

Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.

2. (251). *Groenlandia* J. Gay

1. (1229). **G. densa** (L.) Fourr. 1869, Ann. Soc. Linn. Lyon, ser. 2, 17: 169. — *Potamogeton densus* L. 1753, Sp. Pl.: 126.

Описан из Франции.

ЗП: Аз.-Куб.; ЗК: Бело-Лаб.; ВК: Ассо-Арг.; ЮЗ: Севан.

Атл., Сев. (юг), Центр., Южн. Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

Фам. 186. *Ruppiaceae* Horan. ex Hutch.*

1. (252). *Ruppia* L.

1. (1230). **R. brachypus** J. Gay. 1848, in Coss., Not. Pl. Crit. 1: 10. — *R. maritima* subsp. *brachypus* (J. Gay) Schlegel, 1901, in Neum. Sverige Fl.: 57. — *R. maritima* auct. fl. cauc. p. p., non L.

Описан из Франции.

ЗП: З. Ставр.; ВП; ЗК: В. Куб.; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Ср. Азия.

2. (1231). **R. drepanensis** Tineo, 1828, in Guss., Fl. Sic. Syn. 2: 878.

Описан с о. Сицилия.

ЗП: З. Ставр.

Южн. Европа; Средиз.; Сев., Ср., Центр. Азия.

3. (1232). **R. maritima** L. 1753, Sp. Pl.: 127.

Описан с морских побережий Европы.

ЗП; СЗЗ: Анап.-Гел.; ЗЗ: Абх.; ВЗ: Ширв., Н. Кур.; Т.

Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Юго-Вост., Южн. Азия; Африка; Америка; Австралия.

4. (1233). **R. cirrhosa** (Petagna) Grande, 1918, Bull. Orto Bot. Napoli, 5: 58. — *Buccaferrea cirrhosa* Petagna, 1787, Inst. Bot. 5: 1826. — *R. spiralis* L. ex Dumort. 1827, Fl. Belg.: 164, p. p. excl. typo, (quoad pl. caucas.).

Описан из Италии.

ЗП: Аз.-Куб.; ВК: Ман.-Самур.; СЗЗ: Анап.-Гел.

*Н. Н. Цвелев

Атл., Южн. Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

Популяции со спирально изогнутыми ножками соцветий из северной части Атлантического океана, имеют более узкие листья и более тонкие стебли и корневища. Мы относим их к особому виду — *R. spiralis* L. ex Dumort.

ORDO 27. CYMODOCEALES

Fam. 187. **Zannichelliaceae** Dumort.*

1. (253). **Zannichellia** L.

1. (1234). **Z. palustris** L. 1753, Sp. Pl.: 969. — *Z. repens* Boenn. 1824, Prodr. Fl. Monast.: 272. — *Z. palustris* L. subsp. *repens* (Boenn.) Rothm. 1963, Excursionsfl. Deutschl. 4: 19, comb. invalid.

Описан из Европы и Северной Америки.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** В. Тер.; **ЗЗ:** Абх., Адж.; **Т:**

Европа (преимущественно близ морских побережий); Сев., Юго-Зап., Ср., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка.

Если в качестве лектотипа или неотипа этого вида будет выбрано растение побережья Балтийского моря с мелкими короткостолбиковыми плодиками и очень узкими листьями, то кавказские популяции *Z. palustris* s.l. должны быть отнесены к подвиду *Z. palustris* subsp. *repens* (Boenn.) Rothm. или к самостоятельному виду *Z. repens* Boenn.

2. (1235). **Z. pedunculata** Reichenb. 1829, in Mössl., Handb. Gewächsk., ed. 2, 3: 1591. — *Z. palustris* var. *pedicellata* Rosén et Wahlenb. 1821, Nova Acta Soc. Sci. Upsal. 8: 254. — *Z. pedicellata* (Rosén et Wahlenb.) Fr. 1832, Nov. Mant. 1: 18. — *Z. palustris* subsp. *pedicellata* (Rosén et Wahlenb.) Hegi, 1907, Ill. Fl. Mitteleur. 1: 141.

Описан из Центральной Европы.

ЗП; ВП; ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка.

3. (1336). **Z. major** Boenn. ex Reichenb. 1829, in Mössl., Handb. Gewächsk., ed. 2, 3: 1591. — *Z. palustris* var. *major* C. Hartm. 1820, Handb. Scand. Fl.: 338. — *Z. palustris* subsp. *major* (C. Hartm.) Ooststr. et Reichg. 1964, Fl. Néerl. 1, 6: 86.

Описан из Германии.

ЗП; ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур.; **СЗЗ; ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан.; **Т:**

Европа; Юго-Зап., Ср., Вост. Азия.

2. (254). **Althenia** Petit

1. (1237). **A. orientalis** (Tzvel.) G. Murillo et Talavera, 1986, Lagascalia, 14, 1: 108. — *A. filiformis* subsp. *orientalis* Tzvel. 1975, Бот. журн. 60, 3: 390. — *A. filiformis* auct. non Petit: Dandy, 1971, in Rech. f., Fl. Iran. 85: 1.

Описан с Алтая.

ЗП: З. Ставр.

Южн. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср. Азия.

*Н. Н. Цвелев