

## ORDO 28. ZOSTERALES

Fam. 188. **Zosteraceae** Dumort.\*

### 1. (255). **Zostera** L.

#### Sect. 1. **Zosterella** Aschers.

1. (1238). **Z. noltii** Hornem. 1832, Fl. Dan. 12, 35: 3, tab. 2041. — *Phucagrostis minor* Cavol. 1792, Phucagr.: 14, tab. 2, nom. illeg. — *Z. nana* Roth, 1827, Enum. 1: 8, nom. illeg. — *Z. minor* (Cavol.) Nolte ex Reichenb. 1845, Icon. Fl. Germ. 7: 2, nom. illeg.

Описан из Сев. Европы.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ВЗ:** Ширв.

Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

Следуя большинству современных авторов, мы принимаем для этого вида название *Z. noltii*, хотя отказ от приоритетного названия *Z. nana* представляется нам недостаточно обоснованным.

#### Sect. 2. **Zostera**

2. (1239). **Z. marina** L. 1753, Sp. Pl.: 968.

Описан с побережий Балтийского моря и Атлантического океана.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ВЗ:** Ширв.

Европа (морские побережья); Юго-Зап., Вост. Азия; Сев. Америка.

## Subclassis Aridae

### Superordo Aranae

## ORDO 29. ARALES

Fam. 189. **Araceae** Adans.\*

### 1. (256). **Arum** L.

#### Sect. 1. **Arum**

1. (1240). **A. orientale** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 407. — *A. maculatum* auct. non L.: Кононов и Малькова, 1974, Новости сист. высш. раст. 11: 82.

Описан из Крыма и Кавказа: «... frequens in umbrosis sylvaticis tam Tauriae quam Caucasi». Lectotypus: (Tzvelev, hoc loco) «*Arum orientale* Bieb. Herb. Fischer» (LE!).

**ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.

Юго-Вост. Европа (Крым); Юго-Зап. Азия (Турция).

2. (1241). **A. consobrinum** Schott, 1860, Prodr. Syst. Aroid.: 87. — *A. albispalum* auct. non Stev. ex Ledeb.: Кузен. 1935, Фл. СССР, 3: 487, р. р.; Гросср. 1949, Опред. раст. Кавк.: 722.

Описан с Кавказа. Typus: «*Arum consobrinum* Schott. Caucasus. Teste Schott.» (LE!).

\*Н. Н. Цвелев

**ВК:** Кубин.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (?).

От *A. orientale* отличается более крупными и более тонкими покрывалами початков и придатками початка, постепенно переходящими в короткую ножку, а от *A. albispalum* — значительно более тонкой и более длинной основной частью придатков початка, постепенно переходящей в короткую ножку.

3. (1242). **A. albispalum** Stev. ex Ledeb. 1852, Fl. Ross. 4: 9. — *A. italicum* subsp. *albispalum* (Stev. ex Ledeb.) Prime, 1978, Bot. Journ. Linn. Soc. London 76, 4: 384. — *A. italicum* auct. non L.: Boiss. 1881, Fl. Or. 5: 40, p. p.; R. R. Mill, 1984, in P. H. Davis, Fl. Turk. 8: 44, p. p.

Описан из Абхазии. Турус: «Awchasia, in locis humidis ad fl. Metschisch inter castella Pitzunda et Vambori, leg. Normann» (LE!).

**СЗЗ; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич. (окр. Лагодехи).

Юго-Вост. Европа (южный берег Крыма); Юго-Зап. Азия (Турция).

## Sect. 2. Dioscoridea (Engl.) P. C. Boyce

4. (1243). **A. rupicola** Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. Nov., ser. 1, 13: 7. — *A. detruncatum* C. A. Mey. ex Schott, 1860, Prodr. Syst. Aroid.: 80; Boiss. 1881, Fl. Or. 5: 36. — *A. conophalloides* Kotschy et Schott, 1860, l. c.: 97; Таманян, 2001, во Фл. Арм. 10: 567. — *A. elongatum* subsp. *detruncatum* (C. A. Mey. ex Schott) Riedl, 1963, in Rech. f. Fl. Iran. 1: 5; R. R. Mill, 1984, in P. H. Davis, Fl. Turk. 8: 49. — *A. elongatum* auct. non Stev.: Кузен. 1935, Фл. СССР, 3: 486, p. p.

Описан из Сирии. Турус: «In rupestribus umbrosis Antilibani supra Zebdani, leg. Kotschy» (G).

**ВК:** Кубин.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич. (вост.), Ширв. (горы), Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Юго-Зап. Азия.

У var. *rupicola* покрывало светло-зеленое, а у var. *detruncatum* (C. A. Mey. ex Schott) Tzvel. (1993, Бюл. Моск. об-ва исп. прир., отд. биол. 98, 6: 107) грязно-розово-фиолетовое.

5. (1244). **A. nordmannii** Schott, 1856, Syn. Aroid.: 12; id. 1860, Prodr. Syst. Aroid.: 88 — *A. elongatum* Stev. 1857, Bull. Soc. Nat. Moscou, 30: 67; id. 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 2: 265, nom. nud. — *A. orientale* subsp. *elongatum* (Stev.) Engl. 1920, Pflanzenareale 73(IV, 23): 79.

Описан из Крыма. Турус: «Tauria meridionalis. Leg. Nordmann» (B).

**ЗП:** Аз-Куб. (окр. Тамани, по р. Кубань); **ЗК; СЗ; ЮЗ:** Дар.

Юго-Вост. (Крым), Вост. Европа (Донецкий кряж); Юго-Зап. Азия (Турция).

## 2. (257). Arisarum Mill.

1. (1245). **A. vulgare** O. Targ.-Tozz. 1810, Ann. Mus. Fis. Firenze 2, 2: 67. — *Arum arisarum* L. 1753, Sp. Pl.: 966.

Описан из Южн. Европы и Сев.-Зап. Африки.

**ЗЗ:** Адж. (в окр. Батуми, одичавший).

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.