

ВК: Кубин.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (?).

От *A. orientale* отличается более крупными и более тонкими покрывалами початков и придатками початка, постепенно переходящими в короткую ножку, а от *A. albispalum* — значительно более тонкой и более длинной основной частью придатков початка, постепенно переходящей в короткую ножку.

3. (1242). **A. albispalum** Stev. ex Ledeb. 1852, Fl. Ross. 4: 9. — *A. italicum* subsp. *albispalum* (Stev. ex Ledeb.) Prime, 1978, Bot. Journ. Linn. Soc. London 76, 4: 384. — *A. italicum* auct. non L.: Boiss. 1881, Fl. Or. 5: 40, p. p.; R. R. Mill, 1984, in P. H. Davis, Fl. Turk. 8: 44, p. p.

Описан из Абхазии. Турус: «Awchasia, in locis humidis ad fl. Metschisch inter castella Pitzunda et Vambori, leg. Normann» (LE!).

СЗЗ; ЗЗ: Туап.-Адл., Абх.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич. (окр. Лагодехи).

Юго-Вост. Европа (южный берег Крыма); Юго-Зап. Азия (Турция).

Sect. 2. Dioscoridea (Engl.) P. C. Boyce

4. (1243). **A. rupicola** Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. Nov., ser. 1, 13: 7. — *A. detruncatum* C. A. Mey. ex Schott, 1860, Prodr. Syst. Aroid.: 80; Boiss. 1881, Fl. Or. 5: 36. — *A. conophalloides* Kotschy et Schott, 1860, l. c.: 97; Таманян, 2001, во Фл. Арм. 10: 567. — *A. elongatum* subsp. *detruncatum* (C. A. Mey. ex Schott) Riedl, 1963, in Rech. f. Fl. Iran. 1: 5; R. R. Mill, 1984, in P. H. Davis, Fl. Turk. 8: 49. — *A. elongatum* auct. non Stev.: Кузен. 1935, Фл. СССР, 3: 486, p. p.

Описан из Сирии. Турус: «In rupestribus umbris Antilibani supra Zebdani, leg. Kotschy» (G).

ВК: Кубин.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич. (вост.), Ширв. (горы), Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Юго-Зап. Азия.

У var. *rupicola* покрывало светло-зеленое, а у var. *detruncatum* (C. A. Mey. ex Schott) Tzvel. (1993, Бюл. Моск. об-ва исп. прир., отд. биол. 98, 6: 107) грязно-розово-фиолетовое.

5. (1244). **A. nordmannii** Schott, 1856, Syn. Aroid.: 12; id. 1860, Prodr. Syst. Aroid.: 88 — *A. elongatum* Stev. 1857, Bull. Soc. Nat. Moscou, 30: 67; id. 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 2: 265, nom. nud. — *A. orientale* subsp. *elongatum* (Stev.) Engl. 1920, Pflanzenareale 73(IV, 23): 79.

Описан из Крыма. Турус: «Tauria meridionalis. Leg. Nordmann» (B).

ЗП: Аз-Куб. (окр. Тамани, по р. Кубань); **ЗК; СЗ; ЮЗ:** Дар.

Юго-Вост. (Крым), Вост. Европа (Донецкий кряж); Юго-Зап. Азия (Турция).

2. (257). Arisarum Mill.

1. (1245). **A. vulgare** O. Targ.-Tozz. 1810, Ann. Mus. Fis. Firenze 2, 2: 67. — *Arum arisarum* L. 1753, Sp. Pl.: 966.

Описан из Южн. Европы и Сев.-Зап. Африки.

ЗЗ: Адж. (в окр. Батуми, одичавший).

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.